

# الزهري: ماذا تعني نتيجة فحصك الإيجابية؟



Public Health  
Agency

## معلومات إضافية

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مرض الزهري  
على الرابط التالي:

[www.nidirect.gov.uk/articles/antenatal-infectious-disease-screening](http://www.nidirect.gov.uk/articles/antenatal-infectious-disease-screening)



كما يمكن الاطلاع على تفاصيل عيادات الصحة الجنسية أو عيادات  
أمراض الجهاز البولي التناسلي في أيرلندا الشمالية من خلال الرابط:

[www.sexualhealthni.info/genitourinary-medicine-gum-clinics](http://www.sexualhealthni.info/genitourinary-medicine-gum-clinics)



### Public Health Agency

12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.

Tel: 0300 555 0114 (local rate).

[www.publichealth.hscni.net](http://www.publichealth.hscni.net)

Find us on:



## ماذا يحدث لطفلي بعد الولادة؟

إذا كنتِ بحاجة إلى علاج لمرض الزهري خلال فترة الحمل، فسيحتاج طفلكِ إلى أن يفحصه طبيب أطفال (طبيب متخصص في صحة الأطفال حديثي الولادة) بعد الولادة، وإجراء بعض تحاليل الدم. قد تحتاج نسبة صغيرة جدًا من المواليد للبقاء في المستشفى لتلقي علاج بالمضادات الحيوية.

ستتم متابعة الطفل لبضعة أشهر بعد الولادة للتأكد من بقاءه بصحة جيدة وعافية تامة.

## هل من الآمن إرضاع طفلي رضاعة طبيعية إذا كانت نتيجة فحص الزهري إيجابية؟

نعم، يمكنكِ إرضاع طفلكِ رضاعة طبيعية.

## من يجب أن يعلم بإصابتي بمرض الزهري؟

من المهم أن يكون جميع اختصاصيي الرعاية الصحية المشاركين في رعايتكِ ورعاية طفلكِ على دراية بتشخيصكِ، وذلك بعد الحصول على موافقتكِ، ليتمكنوا من التأكد من حصولكِ أنتِ وطفلكِ على علاج فعال.

ويكون احتمال انتقال الزهري الخُلقي إلى طفلك أكبر في المراحل المبكرة من إصابتك بالعدوى، كما قد يزيد من خطر تعرضك للإجهاض، أو الولادة المبكرة، أو ولادة جنين ميت.

يمكن الوقاية من الزهري الخُلقي من خلال الحصول على علاج بالمضادات الحيوية قبل ولادة طفلك، وإذا لزم الأمر، بإعطاء طفلك علاجًا بالمضادات الحيوية بعد الولادة.

من المهم جدًا أن تحرصي على حضور المواعيد في عيادة الصحة الجنسية وتلقي علاجك في أقرب وقت ممكن بعد التشخيص للمساعدة في منع انتقال العدوى إلى طفلك.

### هل علاج الزهري آمن خلال فترة الحمل؟

العلاج بالمضادات الحيوية (عادةً البنسلين) آمن خلال فترة الحمل ولن يضر بطفلك. إذا كنتِ تعانين من حساسية تجاه البنسلين، سيناقدش الطبيب معكِ خيارات العلاج البديلة. في بعض الأحيان، إذا تَلقيتِ العلاج في مرحلة مبكرة من عدوى الزهري، فإنه قد يسبب رد فعل قصير المدى قد يتضمن أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا، والتي عادةً ما تستمر لبضعة أيام.

إن أفضل طريقة لحماية طفلك هي إكمال العلاج بالكامل.

### كيف سأعرف أن العلاج قد نجح؟

ستقوم عيادة الصحة الجنسية بإجراء فحوصات دم إضافية في مراحل مختلفة بعد علاجك للتأكد من القضاء على العدوى تمامًا.

كما سيتم فحص دمكِ بعد ولادة طفلك أيضًا.

سيوصي فريق الصحة الجنسية أيضًا بضرورة فحص شريكك وعلاجه إذا لزم الأمر، لكي لا ينقل إليك العدوى مجددًا بعد علاجك. ستحتاجين إلى تجنّب الاتصال الجنسي مع شريكك حتى تُكْمَلَا كلاكما العلاج. إذا حظيتِ بشريك حياة آخر أثناء فترة الحمل، فقد تحتاجين إلى إجراء فحصٍ آخر. استفسري من ممرضات التوليد أو فريق الصحة الجنسية بشأن إعادة الفحص إذا كنتِ قلقة.

### حماية طفلك

إن الإصابة بالزهري أثناء فترة الحمل تعني أن العدوى يمكن أن تنتقل إلى جنينك في أي وقت خلال فترة الحمل أو أثناء الولادة، مسببة حالة تُعرف بالزهري الخِلقي، والتي قد تترتب عليها تأثيرات طويلة الأمد على طفلك.



لقد أظهر اختبار الفحص الأخير أنك مصابة بعدوى تُدعى مرض الزهري.

يوضح هذا الكتيب ماهية مرض الزهري وما تأثيره على حملك وطفلك.

## ما المقصود بمرض الزهري؟

الزُّهري هو عدوى بكتيرية. غالبًا ما تمر هذه العدوى دون أن تُلاحظ لأن علاماتها وأعراضها لا تكون واضحة دائمًا. إذا تُركَّ الزهري دون علاج، فإنه يُعد حالة خطيرة يمكن أن تتطور عبر مراحل مختلفة قد تستمر لأسابيع وشهور وحتى سنوات، وقد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة لك ولطفلك.

## كيف ينتقل مرض الزهري؟

يمكن أن ينتقل مرض الزهري للآخرين عن طريق:

- الاتصال المباشر بقرحة الزهري، الذي يحدث عادةً أثناء الجماع غير الآمن
- مشاركة الإبر أو معدّات تعاطي العقاقير المُلوّثة
- انتقال العدوى من الأم إلى الجنين أثناء الحمل أو عند الولادة.

## العلاج أثناء فترة الحمل

ستتم إحالتك إلى عيادة الصحة الجنسية (المعروفة أيضًا باسم عيادة أمراض الجهاز البولي التناسلي) التي ستقرر نوع العلاج الذي قد تحتاجين إليه.

يمكن علاج الزهري بواسطة المضادات الحيوية، ومن المهم إكمال فترة العلاج بالكامل.

حتى إذا كنتِ قد تلقيت علاجًا للزهري في الماضي، فيمكنك أن تصابي بالعدوى مرة أخرى، وقد تحتاجين إلى إعادة العلاج.