

## **Co dzieje się z moim dzieckiem po porodzie?**

Jeśli musiałaś leczyć kiłę w ciąży, Twoje dziecko będzie musiało zostać zbadane po urodzeniu przez specjalistę pediatrę (od niemowląt) i poddane kilku badaniom krwi. Bardzo niewielka liczba dzieci może wymagać pobytu w szpitalu w celu leczenia antybiotykami.

Dziecko będzie monitorowane przez kilka miesięcy po urodzeniu, aby upewnić się, że jest zdrowe i dobrze się czuje.

## **Czy karmienie piersią jest bezpieczne, jeśli mam pozytywny wynik testu na kiłę?**

Tak, możesz karmić piersią swoje dziecko.

## **Kto musi wiedzieć, że mam kiłę?**

Ważne jest, aby za Twoją zgodą wszyscy pracownicy służby zdrowia zaangażowani w opiekę nad Tobą i Twoim dzieckiem byli świadomi Twojej diagnozy, aby mogli zapewnić Tobie i Twojemu dziecku skuteczne leczenie.

## Dodatkowe informacje



Dodatkowe informacje na temat kiły można znaleźć na stronie: [www.nidirect.gov.uk/articles/antenatal-infectious-disease-screening](http://www.nidirect.gov.uk/articles/antenatal-infectious-disease-screening)



Dane klinik zdrowia seksualnego i chorób układu moczowo-płciowego (GUM) w Irlandii Północnej można znaleźć na stronie: [www.sexualhealthni.info/genitourinary-medicine-gum-clinics](http://www.sexualhealthni.info/genitourinary-medicine-gum-clinics)



### Public Health Agency

12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.  
Tel: 0300 555 0114 (local rate).  
[www.publichealth.hscni.net](http://www.publichealth.hscni.net)

Find us on:



# Kiła: co oznacza pozytywny wynik badania przesiewowego



Public Health  
Agency

**Twoje ostatnie badanie przesiewowe wykazało, że masz infekcję zwaną kiłą.**

**Ta ulotka wyjaśnia, czym jest kiła, i co oznacza dla Twojej ciąży i dziecka.**

## Czym jest kiła?

Kiła to infekcja bakteryjna. Często pozostaje niezauważona, ponieważ jej oznaki i objawy nie zawsze są oczywiste. Nieleczona kiła jest poważnym schorzeniem, które może przechodzić przez różne stadia, trwające tygodnie, miesiące, a nawet lata, i prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych dla Ciebie i Twojego dziecka.

## Jak przenosi się kiła?

Kiła może zostać przeniesiona na inne osoby:

- poprzez bezpośredni kontakt z owrzodzeniem kiłowym (wrzodem), zazwyczaj podczas stosunku płciowego bez zabezpieczenia
- poprzez dzielenie się zakażonymi igłami lub sprzętem do zażywania narkotyków
- z matki na dziecko w czasie ciąży lub porodu.

## Leczenie w ciąży

Zostaniesz skierowana do kliniki zdrowia seksualnego (znanej również jako klinika chorób układu moczowo-płciowego), która zdecyduje o rodzaju leczenia, jakiego możesz potrzebować.


Kiłę można wyleczyć antybiotykami i ważne jest, aby ukończyć pełną kurację.

Nawet jeśli byłaś leczona na kiłę w przeszłości, może dojść u Ciebie do ponownego zakażenia i może być konieczne ponowne leczenie.

Aby nie dopuścić do ponownego zakażenia po leczeniu, zespół ds. zdrowia seksualnego zaleci również zbadanie Twojego partnera i, w razie potrzeby, jego leczenie. Będziesz musiała unikać kontaktów seksualnych z partnerem do czasu zakończenia przez Was leczenia. Jeśli w trakcie ciąży zmienisz partnera, być może będziesz musiała poddać się kolejnemu badaniu. Jeśli będzie Cię to martwiło, zapytaj położną lub zespół ds. zdrowia seksualnego o możliwość ponownego wykonania badań.

## Ochrona dziecka

Kiłą w ciąży można zarazić nienarodzone dziecko w dowolnym momencie ciąży lub porodu, powodując schorzenie znane jako kiła wrodzona, które może mieć długotrwałe skutki dla dziecka.



Kiłą wrodzoną można z większym prawdopodobieństwem zarazić dziecko we wczesnym stadium zakażenia i może ona zwiększyć ryzyko poronienia, urodzenia martwego dziecka lub porodu przedwczesnego.

Kilę wrodzonej można zapobiegać stosując antybiotykoterapię przed urodzeniem dziecka i, w razie potrzeby, po urodzeniu.

Aby zapobiec przeniesieniu zakażenia na dziecko, bardzo ważne jest, aby zgłaszać się na wizyty w poradni zdrowia seksualnego i rozpocząć leczenie jak najszybciej po diagnozie.

### **Czy leczenie kiły jest bezpieczne w czasie ciąży?**

Leczenie antybiotykami (zazwyczaj penicyliną) jest bezpieczne w czasie ciąży i nie zaszkodzi dziecku. Jeśli masz alergię na penicylinę, lekarz omówi z Tobą alternatywne leczenie. Czasami, kiedy leczysz się, kiedy infekcja kiłą jest we wczesnym stadium, leczenie może wywołać krótkotrwałą reakcję, która może obejmować chorobę „grypopodobną”, która zazwyczaj trwa kilka dni.

Najlepszym sposobem ochrony dziecka jest dokończenie leczenia.

### **Skąd będę wiedzieć, czy leczenie zadziałało?**

Po leczeniu klinika zdrowia seksualnego wykona na różnych etapach dalsze badania krwi, aby upewnić się, że infekcja ustąpiła.

Twoja krew zostanie również zbadana po urodzeniu dziecka.