

## **O que acontece ao meu bebê após o parto?**

Se você necessitar de tratamento para a sífilis durante a gravidez, o seu bebê terá de ser examinado por um médico pediatra especialista após o parto e de fazer análises ao sangue. Um número muito pequeno de bebês poderá ter de ficar no hospital para receber tratamento com antibióticos.

O bebê poderá receber acompanhamento durante alguns meses após o parto, para se certificarem de que está bem e saudável.

## **É seguro amamentar o meu bebê se eu testar positivo à sífilis?**

Sim, pode amamentar o bebê.


## **Quem precisa de saber que tenho sífilis?**

É importante que, com a sua autorização, todos os profissionais de saúde a prestar cuidados a si e ao seu bebê estejam cientes do seu diagnóstico, para se poderem certificar de que você e o seu bebê recebem tratamento eficaz.

## Mais informação



Pode consultar mais informação sobre a sífilis em: [www.nidirect.gov.uk/articles/antenatal-infectious-disease-screening](http://www.nidirect.gov.uk/articles/antenatal-infectious-disease-screening)



Pode consultar informação sobre as clínicas de saúde sexual ou medicina geniturinária (GUM) na Irlanda, em: [www.sexualhealthni.info/genitourinary-medicine-gum-clinics](http://www.sexualhealthni.info/genitourinary-medicine-gum-clinics)



### Public Health Agency

12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.  
Tel: 0300 555 0114 (local rate).  
[www.publichealth.hscni.net](http://www.publichealth.hscni.net)

Find us on:



# Sífilis: o significado do seu resultado positivo no rastreio



Public Health  
Agency

## **O seu teste de rastreio recente detetou uma infeção chamada sífilis.**

**Esta brochura explica o que é a sífilis e o que significa para a sua gravidez e para o bebé.**

### **O que é a sífilis?**

A sífilis é uma infeção bacteriana. Muitas vezes não é detetada, porque os sinais e sintomas nem sempre são óbvios. Se não for tratada, a sífilis é uma doença grave que pode passar por vários estágios que podem durar semanas, meses ou mesmo anos, e podem causar-lhe problemas graves de saúde a si e ao seu bebé.

### **Como é que a sífilis se transmite?**

A sífilis pode ser transmitida através:

- do contacto direto com um cancro duro (ferida) da sífilis, normalmente durante o sexo sem proteção
- da partilha de agulhas ou equipamento para consumo de droga infetado
- da transmissão da mãe para o bebé durante a gravidez ou parto.

### **Tratamento na gravidez**

Será encaminhada para a clínica de saúde sexual (também chamada clínica de Medicina Geniturinária), que decidirá qual o tratamento de que poderá necessitar.

A sífilis pode ser curada com tratamento com antibióticos e é importante que termine o tratamento todo.

Mesmo que já tenha recebido tratamento para a sífilis no passado, pode voltar a ser infetada e poderá necessitar novamente de tratamento.

A equipa de saúde sexual também recomendará que o(a) seu(sua) parceiro(a) seja testado(a) e tratado(a), se necessário, para não a voltar a infetar após o tratamento. Terá de evitar o contacto sexual com o(a) seu(sua) parceiro(a) até terem ambos(as) terminado o tratamento. Se mudar de parceiro(a) durante a gravidez, poderá ter de ser novamente testado(a). Peça à sua parteira ou equipa de saúde sexual para repetir o teste, se estiver preocupada.

### **Proteger o seu bebé**

A sífilis na gravidez significa que a infeção pode ser transmitida ao feto a qualquer altura durante a gravidez ou parto, causando uma doença chamada sífilis congénita, a qual pode ter consequências a longo prazo para o seu bebé.



É mais provável que a sífilis congénita seja transmitida ao bebé numa fase precoce da sua infeção e pode vir a aumentar a probabilidade de ter um aborto espontâneo, nado morto ou parto prematuro.

É possível evitar a sífilis congénita mediante tratamento com antibióticos antes do parto e, se necessário, tratamento do bebé com antibióticos após o parto.

É realmente importante que vá às consultas na clínica de saúde sexual e que receba o seu tratamento assim que possível após o diagnóstico, para ajudar a evitar a transmissão da infeção ao bebé.

## **O tratamento para a sífilis é seguro durante a gravidez?**

O tratamento com antibióticos (normalmente penicilina) é seguro durante a gravidez e não fará mal ao bebé. Se for alérgica à penicilina, o médico discutirá um tratamento alternativo consigo. Por vezes, ao receber tratamento numa fase precoce da sífilis, o tratamento pode causar uma reação a curto prazo que pode incluir uma doença semelhante à gripe que dura, normalmente, alguns dias.

A melhor maneira de proteger o seu bebé consiste em completar o tratamento.

## **Como posso saber se o tratamento funcionou?**

A clínica de saúde sexual fará novas análises ao sangue a várias etapas após o seu tratamento, para garantir que a infeção desapareceu.

Também lhe farão análises ao sangue após o parto.