

Ce se întâmplă cu bebelușul după naștere?

Dacă aveți nevoie de tratament pentru sifilis în timpul sarcinii, bebelușul dvs. va fi examinat de un medic pediatru specialist după naștere, care îi va face teste de sânge. Puțini bebeluși trebuie să rămână internați în spital pentru tratamentul cu antibiotice.

Bebelușul va fi examinat timp de câteva luni după naștere pentru a verifica că rămâne bine sănătos.

Este bine să-mi alăptez copilul dacă am fost testată pozitiv de sifilis?

Da, puteți să alăptați bebelușul.

Cine trebuie să știe că am sifilis?

Este important să vă dați permisiunea ca toate cadrele medicale implicate în îngrijirea dvs. și a copilului, să afle diagnosticul dvs., astfel încât să verifice că dumneavoastră și copilul primiți un tratament eficient.

Informații suplimentare



Informații suplimentare despre siflis găsiți accesând: www.nidirect.gov.uk/articles/antenatal-infectious-disease-screening



Detalii privind sănătatea sexuală sau clinicile de medicină genito-urinară (GUM) din Irlanda de Nord pot fi găsite la: www.sexualhealthni.info/genitourinary-medicine-gum-clinics



Public Health
Agency

Public Health Agency

12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.

Tel: 0300 555 0114 (local rate).

www.publichealth.hscni.net

Find us on:



Siflis: ce înseamnă rezultat pozitiv



Public Health
Agency

Testul de screening recent a arătat că sunteți infectată cu siflis.

Acest pliant explică ce este siflisul și ce înseamnă pentru sarcina și copilul dvs.

Ce este siflisul?

Siflisul este o infecție bacteriană. Adesea trece neobservată, deoarece semnele și simptomele nu sunt întotdeauna evidente. Lăsat netratat, siflisul este o afecțiune gravă care poate progresa timp de săptămâni, luni și chiar ani și poate duce la probleme grave de sănătate pentru dumneavoastră și copilul dvs.

Cum se transmite siflisul?

Siflisul poate fi transmis altora astfel:

- prin contact direct cu un șancru siflitic (ulcerație), în timpul actului sexual neprotejat
- folosirea în comun a acelor sau echipamentelor infectate pentru uzul de droguri
- transmiterea de la mamă la copil în timpul sarcinii sau la naștere.

Tratamentul în timpul sarcinii

Vi se va face trimitere la clinica de sănătate sexuală (clinica de medicină genito-urinară), care va decide ce tratament aveți nevoie.

Siflisul poate fi vindecat cu antibiotice și este important să urmați întregul ciclu de tratament.

Chiar dacă ați fost tratată pentru siflis în trecut, vă puteți reinfecta și poate fi necesar să vă tratați din nou.

Echipa de sănătate sexuală va recomanda, de asemenea, ca partenerul dvs. să fie testat și tratat, dacă este necesar, astfel încât să nu vă reinfecteze după tratament. Va trebui să evitați contactul sexual cu partenerul, până când terminați amândoi tratamentul. Dacă vă schimbați partenerul în timpul sarcinii, puteți fi testată din nou. Discutați cu moașa sau cu echipa de sănătate sexuală despre retestare dacă sunteți îngrijorată.

Protejați-vă copilul

Sifilisul în timpul sarcinii înseamnă că infecția poate fi transmisă copilului dvs. nenăscut în orice moment în timpul sarcinii sau nașterii, provocând o afecțiune cunoscută sub numele de sifilis congenital, care poate avea efecte pe termen lung asupra copilului dvs.



Siflisul congenital este mai probabil să fie transmis copilului dvs. în stadiile incipiente ale infecției și poate crește riscul de a avea un avort spontan, nașterea unui copil mort sau nașterea prematură.

Siflisul congenital poate fi prevenit prin administrarea de antibiotice înainte de naștere și, dacă este necesar, prin administrarea de antibiotice copilului după naștere.

Este foarte important să mergeți la programările de la clinica de sănătate sexuală și să primiți tratamentul cât mai curând posibil după diagnosticare, pentru a ajuta la prevenirea transmiterii infecției copilului dvs.

Tratamentul pentru siflis este sigur în timpul sarcinii?

Tratamentul cu antibiotice (de obicei penicilină) este sigur în timpul sarcinii și nu va dăuna copilului. Dacă sunteți alergică la penicilină, medicul va discuta cu dumneavoastră despre un tratament alternativ. Câteodată, dacă sunteți tratată atunci când infecția cu siflis se află într-un stadiu incipient, tratamentul poate provoca o reacție pe termen scurt „asemănătoare gripei” care, în general, durează câteva zile.

Cel mai bun mod de a vă proteja bebelușul este să urmați tot tratamentul.

Cum aflu dacă tratamentul a funcționat?

Clinica de sănătate sexuală va efectua teste de sânge suplimentare în diferite etape după tratament, pentru a se asigura că infecția a fost eliminată.

Sângele dvs. va fi testat de asemenea după nașterea copilului.