

# Imdhíonadh

do leanaí 18 mí d'aois



## Vacsaín DTAP/IPV/HIB/HepB (6-in-1)

Ba chóir go mbeadh do leanbh a lmdhíonadh le vacsaín DTAP/IPV/HIB/HepB nuair a bhí siad 8, 12 agus 16 seachtaine d'aois.

Cosnaíonn an vacsaín 6-in-1 i gcoinne 6 ghalar éagsúla:

- diftéire
- teiteanas
- triuch
- póilió
- Haemophilus influenzae cineál b (Hib)
- heipitíteas B

**Ba chóir go mbeadh a gceathrú dáileog de vacsaín 6-in-1 ag do leanbh ag 18 mí (in éineacht lena dara dáileog de MMRV).**

Cuideoidh sé seo lena gcosaint i gcoinne na galair seo a leathnú go dtí go dtí an chéad dáileog vacsaín eile atá dlite ag timpeall 3 bliana agus 4 mhí d'aois.

## Éifeachtacht an vacsaín DTAP/IPV/HIB/HepB (6-in-1)

Léirigh staidéir go bhfuil an vacsaín 6-in-1 an-éifeachtach chun do leanbh a chosaint i gcoinne na 6 ghalar tromchúiseacha seo.

Teastaíonn dáileoga breise chun cosaint a leathnú go dtí daoine fásta. Cuideoidh an vacsaín 4-in-1 a thugtar ag 3 bliana agus 4 mhí le cosaint a leathnú i gcoinne teiteanas, diftéire, póilió agus triuch thar a gcuid scoilbhlianta. Cuideoidh an vacsaín a thugtar ag 14 bliana d'aois iad a chosaint i gcoinne diftéire, teiteanas agus póilió mar dhaoine fásta.

## Diftéire

Is galar tromchúiseach é diftéire a thosaíonn de ghnáth le scornach tinn agus a d'fhéadfadh fadhbanna anáilithe a bheith ina chúis go tapa. Féadann sé damáiste a dhéanamh don chroí agus don néarchóras agus, i gcásanna tromchúiseacha, féadann sé a mharú. Sula dtugadh an vacsaín diftéire isteach, bhí suas le 1,500 cás diftéire in aghaidh na bliana i dTuaisceart Éireann.

## Teiteanas

Is galar é an teiteanas a théann i bhfeidhm ar an néarchóras a d'fhéadfadh freangaí matáin a bheith mar thoradh air, fadhbanna anáilithe a chruthú agus féadann sé a mharú. Is cúis leis nuair a théann frídíní a fhaightear in ithir agus aoileach isteach sa chorp trí gearrthacha nó dónna oscailte. Ní féidir teiteanas a chur ar aghaidh ó dhuine go duine.

## Triuch

Is galar é triuch a d'fhéadfadh casacht fada casacht agus tachtadh a bheith ina chúis, rud a fhágann go bhfuil sé deacair anáil. Is féidir le triuch maireachtáil suas le 10 seachtaine. Tá naíonáin faoi bhun 1 bhliain d'aois an mbaol is mó i mbaol ó triuch. Maidir leis na leanáí seo, tá an galar an-tromchúiseach agus féadann sé a mharú. De ghnáth ní bhíonn sé chomh tromchúiseach i leanáí níos sine.

Tuairiscíodh breis agus 3,000 cásanna triuch deimhnithe i dTuaisceart Éireann in 2024. Cuireann an borradh seo i gcásanna le déanaí béim ar cé chomh tábhachtach is atá sé a chinntiú go bhfaigheann do leanbh a vacsaíní.

## Póilió

Is víreas é póilió a ionsaíonn an néarchóras agus is féidir leis na matáin a cur pairilis ar. Má théann sé i bhfeidhm ar na matáin cliabhach nó ar an inchinn, is féidir le póilió a mharú.

Sula dtugadh an vacsaín póilió isteach, tharla an oiread agus 1,500 cásanna de phóilió ina chúis le pairilis gach bliain i dTuaisceart Éireann.

## Hib

Is ionfhabhtú é Hib de bharr baictéir *Haemophilus influenzae* cineál b. D'fhéadfadh roinnt galair

mhóra mar nimhiú fola (seipticéime), niúmóine agus meiningíteas a bheith mar thoradh air. Ní chosnaíonn an vacsaín Hib ach do leanbh i gcoinne an chineál meiningíteas de bharr baictéir *Haemophilus influenzae* cineál b - ní chosnaíonn sé i gcoinne aon chúiseanna eile le meiningíteas.

Is féidir leis na tinnis de bharr Hib a mharú mura ndéantar iad a chóireáil go tapa. Sula dtugadh isteach an vacsaín Hib, bhí thart ar 800 cás de Hib i leanáí óga gach bliain. Ó tugadh isteach an vacsaín, tá líon na leanáí faoi bhun 5 bliana d'aois le Hib titim 99%.

## Heipitíteas B

Is ionfhabhtú an ae é heipitíteas B de bharr an víreas heipitíteas B. I leanáí, is féidir leis an ionfhabhtú leanúint ar feadh blianta fada agus uaireanta d'fhéadfadh deacrachtaí a bheith mar thoradh ar nós craiceáil an ae (ciorróis), agus ailse ae.

Cé go bhfuil líon na leanáí atá ina gcónaí leis an víreas heipitíteas B íseal sa RA, cuireadh an vacsaín ar fáil do leanáí a bhí i mbaol níos airde ó na 1980idí. In 2017, cuireadh vacsaín heipitíteas B leis an ngnáthchlár imdhíonaithe ionas gur féidir le gach páiste leas a bhaint as cosaint i gcoinne an víreas seo.

Cuirfear 4 dáileog den vacsaín 6-i-1 cosaint fada buan ar fáil i gcoinne ionfhabhtú le heipitíteas B, ach ní do chineálacha eile heipitíteas.

## Conas a thugtar an vacsaín

Déantar an vacsaín a instealladh isteach i matán clé nó lámh uachtarach an linbh.

## Tar éis Imdhíonadh leis an vacsaín 6-in-1

D'fhéadfadh roinnt fo-iarsmaí a fháil do leanbh, atá éadrom de ghnáth, lena n-áirítear:

- deargadh, at nó claonadh nuair a bhí an instealladh acu
- a bheith beagán drochúiseach ar feadh suas le 48 uair an chloig tar éis an t-instealladh
- fiabhras éadrom a fhorbairt
- cnap beag ina raibh an instealladh ag do leanbh; d'fhéadfadh sé seo a mhaireamh ar feadh cúpla seachtain ach imeoidh sé go mall

Má cheapann tú go bhfuil aon imoibriú eile ag do leanbh ar an vacsaín 6-in-1 agus má tá imní ort faoi, labhair le do dhochtúir, le d'altra cleachtais nó le cuairteoir sláinte.

## Vacsaín MMRV

Má leanann do leanbh an sceideal vacsaín reatha (rugadh an 1 Eanáir 2025 nó dá éis), ba cheart go mbeadh a gcéad dáileog de MMRV acu díreach tar éis a gcéad lá breithe ag an am céanna lena vacsaínithe MenB agus PCV. Tugtar an dara dáileog (agus deiridh) ag aois 18 mí, in éineacht leis an vacsaín 6-in-1.

Cosnaíonn MMRV do leanbh i gcoinne bruitíneach, leicneach, rubella (bruitíneach dhearg) agus varicella. Is é Varicella an víreas a chruthaíonn deilgneach.

Má rugadh do leanbh **idir 1 Iúil 2024 agus an 31 Nollaig 2024**, agus má fuair siad dáileog de vacsaín MMR díreach tar éis a gcéad lá breithe, tabharfar dáileog vacsaín MMRV dóibh ag gach ceann dá gcoinní 18 mhí agus 3 bliana 4 mhí.

Tá sé seo chun cosaint níos fearr a sholáthar i gcoinne varicella (deilgneach). Ní chuireann aon imní sábháilteachta ar 3 vacsaíní ina bhfuil MMR a fháil.

## Cineálacha vacsaín MMRV

Tá leaganacha lagaithe de bhruithíneach beo, leicneach, rubella agus víris varicella sa vacsaín MMRV. Toisc go bhfuil na víris lagaithe, ní féidir le daoine a raibh an vacsaín acu daoine eile a ionfhabhtú.

I dTuaisceart Éireann, tá 2 vacsaín MMRV againn. Oibríonn an dá vacsaín go han-mhaith. Tá geilitín muc (geilitín a dhíorthaítear ó mhuca) ar cheann de na vacsaíní. Más fearr leat go mbeadh an vacsaín ag do leanbh nach bhfuil geilitín muc ann, labhair le d'altra cleachtais nó le do dhochtúir.

## Conas a thugtar an vacsaín?

Déantar an vacsaín a instealladh isteach i matán clé nó lámh uachtarach an linbh.

## Éifeachtacht an vacsaín

Ó tugadh vacsaín MMR isteach i 1988, tá cásanna bruitíneach, leicneach agus rubella tar éis titim go leibhéil thar a bheith íseal. Táthar ag súil go laghdóidh cásanna deilgneach go suntasach le comhpháirt varicella leis an gcomhpháirt varicella a chur leis. Laghdóidh an clár cásanna tromchúiseacha deilgneach, deacrachtaí gaolmhara agus ospidéil.



## Bruitíneach

Is é víreas an-thógálach is cúis le bruitíneach. Beidh fiabhras ard, gríos ag beagnach gach duine a ghlacann é agus go ginearálta beidh siad tinn. Is minic a chaithfidh leanaí thart ar 5 lá a chaitheamh sa leaba agus d'fhéadfadh siad a bheith lasmuigh den scoil ar feadh 10 lá. Is dócha go mbeidh daoine fásta tinn ar feadh níos faide.

Ní féidir a rá cé a bheidh tionchar mór ag brúitíneach air. Rachaidh timpeall 1 as gach 5 duine a bhfuil brúitíneach orthu chuig an ospidéal. I measc na deacrachtaí tá ionfhabhtuithe cófra, oiriúnaí, einceifealaíteas (ionfhabhtú na hinchinne) agus damá. I gcásanna an-tromchúiseacha, is féidir le brúitíneach marú.

Sula tugadh vacsaín brúitíneach isteach i 1968, tharla timpeall 500,000 cásanna agus 100 bás i mblianta eipidéime. I 1987 (an bhliain sular tugadh an vacsaín MMR isteach sa RA), ghabh 86,000 leanbh an brúitíneach agus fuair 16 bás.

Is í brúitíneach ar cheann de na galair is tógálacha ar domhan. Is féidir le casacht nó sraoth, ó dhuine ionfhabhtaithe, víreas an bhruithíneach a scaipeadh thar limistéar leathan. Mura gcosnaítear do leanbh, tá an seans go bhfaighidh an brúitíneach thar a bheith ard má thagann tú gar do dhuine ar bith a bhfuil brúitíneach aige nó atá ag forbairt.

### **Leicneach**

Is é víreas is cúis le leicneach a d'fhéadfadh fiabhras, tinneas cinn agus borrfhaireoga pianmhara, ata san aghaidh, sa mhúineál agus san fhód a bheith mar thoradh air. D'fhéadfadh bodhaire buan, meiningíteas víreasach (ionfhabhtú líneála na hinchinne) agus einceifealaíteas a bheith mar thoradh air. Is annamh, bíonn sé ina chúis le at pianmhar ar na uiríocha i bhfear agus na hubhagáin i measc

na mban. Maireann leicneach thart ar 7 go 10 lá. Sula dtugadh isteach an vacsaín MMR, chuaigh thart ar 1,200 duine sa bhliain sa Ríocht Aontaithe isteach san ospidéal mar gheall ar leicneach. Scaiptear leicneach ar an mbealach céanna le brúitíneach agus tá sé chomh tógalach le flú.

### **Rubella**

Is é víreas is cúis le Rubella freisin. I leanaí bíonn sé éadrom de ghnáth agus féadfaidh sé a bheith faoi deara. Tá sé ina chúis le gríos gearrthéarmacha, borrfhaireoga agus scornach tinn.

Nuair a ghlacann bean torrach rubella féadfaidh sé dul i bhfeidhm ar a leanbh sa bhroinn, agus damáiste tromchúiseach dá radharc, éisteacht, croí agus inchinn. Tugtar siondróm rubella ó bhroinn (CRS) ar an riocht seo. Nuair a ghabhann an t-ionfhabhtú sa chéad 3 mhí den toirchis déanann sé damáiste don leanbh sa bhroinn i 9 as 10 gcás.

Sna 5 bliana sular tugadh isteach an vacsaín MMR, rugadh thart ar 43 leanbh in aghaidh na bliana sa RA le siondróm rubella ó bhroinn.

Scaiptear Rubella ar an mbealach céanna le brúitíneach agus leicneach agus tá sé chomh tógalach le flú.



## Varicella

Is galar an-thógálach é Varicella (ar a dtugtar sicín coitianta), de bharr víreas. Tá varicella an-choitianta agus bíonn tionchar ag formhór na leanaí le linn óige, cé gur féidir é a ghabháil den chéad uair ag aois ar bith. Is féidir leis an galar a bheith níos tromchúisí i measc daoine fásta, go háirithe mná torracha agus iad siúd a bhfuil córais imdhíonachta laghdaithe. Tarchuirtear é trí theagmháil dhíreach idir daoine, nó go hindíreach trí ionfhabhtú braoiníneach.


Tá an chuid is mó de na cásanna varicella i leanaí réasúnta éadrom agus réiteann an tinneas gan aon ghá le cóireáil ó phroifisiúnach leighis, cé go bhfuil an chuid is mó de na leanaí breoite ar feadh roinnt laethanta agus caillfidh siad 5 lá nó níos mó ón scoil nó ón naíolann. B'fhéidir go mbeidh ar thuismitheoirí am saor in obair a thógáil chun aire a thabhairt dó.

Leanfaidh roinnt leanaí ar aghaidh ag forbairt deacrachtaí ó varicella lena n-áirítear ionfhabhtú baictéarach loit craicinn (spotaí) agus, i gcásanna neamhchoitianta, einceifealaíteas (at na hinchinne), niúmóiníteas (ionfhabhtú scamhóg) agus stróc. Is féidir leis na deacrachtaí seo a bheith mar thoradh ar an ospidéal agus is annamh a bhféadfadh bás a bheith.

## Tar éis vacsaíniú le MMRV

Tá 4 vacsaín ar leithligh ag MMRV in instealladh amháin. Oibríonn na vacsaíní ag amanna éagsúla. Timpeall 5 go 11 lá tar éis an imdhíonadh, éiríonn roinnt leanaí fiabhras, forbraíonn siad gríos cosúil le miasail agus téann siad as a gcuid bia de réir mar a thosaíonn an chuid brúitíneach den vacsaín ag obair.

Is annamh, thart ar 3 seachtaine tar éis an instealladh, d'fhéadfadh comharthaí cosúil le leicneach a fháil ar leanbh (fiabhras agus borrfhaireoga) de réir mar a thosaíonn cuid na leicneach de MMRV ag obair.



Is annamh, d'fhéadfadh gríos de spotaí beaga cosúil le ballbhrú a bheith le feiceáil laistigh de 6 seachtaine ón vacsaín, de ghnáth is cúis leis an gcuid brúiteach nó rubella. Má tá sé seo le feiceáil, tabhair do leanbh chuig an dochtúir.

D'fhéadfadh gríos éadrom cosúil le deilgneach a bheith le feiceáil tar éis vacsaínithe in aice leis an suíomh insteallta ach is féidir léiriú in áiteanna eile. Níl cóireáil de dhíth ar an ngríos seo agus glanann sé suas leis féin. Má fhaigheann do leanbh gríos, mar réamhchúram seachain dlúth-theagmháil le daoine atá níos leochail ó ionfhabhtú deilgneach, mar shampla iad siúd a bhfuil córais imdhíonachta lagaithe acu, mná torracha nach raibh deilgneach orthu riamh agus nuabhairthe nach raibh deilgneach ag a máithreacha. Mar sin féin, tá an seans go rachaidh deilgneach ón ngríos seo tar éis an vacsaín MMRV a fháil thar a bheith íseal.



Beidh taom ag thart ar 1 as 1,000 de bharr teocht ard (féach leathanach 18 maidir le conas fiabhras a chóireáil). Níl aon fhianaise ann go gcuireann sé seo fadhbanna fadtéarmacha. Tá cúig huairte níos dóichí go mbeidh taom ag leanbh a bhfuil brúiteach aige mar thoradh ar an tinneas (5 in 1,000).

Is féidir le vacsaíní frithghníomhuithe ailléirgeacha. Tá siad seo an-annamh, níos lú ná 1 i gceann milliún Imdhíonadh. Cé go bhfuil imní ar tromchúiseacha frithghníomhuithe ailléirgeacha (anafíolachtacha) nuair a tharlaíonn siad, déantar oiliúint ar na daoine a thugann imdhíonadh chun déileáil le frithghníomhartha anaifíolachtacha, agus beidh téarnamh tapa agus iomlán mar thor.

Is annamh, féadfaidh leanaí einceifealaíteas (at na hinchinne) a fhorbairt tar éis an vacsaín MMRV. Mar sin féin, má ghlacann leanbh nár vacsaínithe an brúiteach, tá an seans go bhforbróidh einceifealaíteas i bhfad níos airde.

Tá fo-iarsmaí tar éis an dara dáileog níos lú coitianta fós agus de ghnáth níos éadrom.

**Is é vacsaíniú an bealach is sábháilte chun do leanbh**

## Ailléirgí uibhe

Féadfar an vacsaín MMRV a thabhairt do leanaí a raibh ailléirge trom acu (frithghníomhú anafiolachtacha) ar ubh. Fástar an vacsaín MMRV ar chealla sicín, ní ar an ubh bán nó an buíocán, dá bhrí sin, léiríodh go bhfuil frithghníomhuithe tromchúiseacha ina dhiaidh sin tar éis an vacsaínithe an-annamh. Má tá aon imní ort, labhair le do dhochtúir, le do altra cleachtais nó le cuairteoir sláinte.

## Imní faoi ró-ualú córas imdhíonachta do linbh

Ní bheidh an vacsaín MMRV a thabhairt do do leanbh, in éineacht leis na vacsaíní eile a thugtar ag an aois chéanna, ní róthóidh a gcóras imdhíonachta.

Ó bhreith, cosnaíonn córais imdhíonachta leanaí iad ó na frídíní atá timpeall orthu. Gan an chosaint seo, ní bheadh leanaí in ann déileáil leis na mílte baictéar agus víris a chlúdaíonn a gcaiceann, a srón, a scornach agus a stéige. Leanann an cosaint seo ar aghaidh ar feadh na saoil.

Go teoiriciúil, d'fhéadfadh leanbh freagairt go héifeachtach do thart ar 10,000 vacsaín ag aon am amháin. Is féidir le córas imdhíonachta an linbh déileáil go héasca leis an MMRV agus leis na vacsaíní tábhachtacha eile a thugtar ag an am céanna.

## Is féidir le tuismitheoirí agus cúramóirí fo-iarsmaí amhrasta a bhaineann le vacsaíní agus cógais a thuairisciú tríd an Scéim Chárta Buí.



Is féidir é seo a dhéanamh trí chuairt a thabhairt ar **mhra.yellowcard.gov.uk** nó trí ghlaoch ar líne an Chárta Buí ar **0800 731 6789**. Is féidir leat an cód MF a úsáid freisin nó tríd an aip Cárta Buí a íoslódáil.

## Imní faoi do leanbh a bheith buartha trí dhá instealladh a bheith agat

Féadfaidh do leanbh caoineadh agus a bheith buartha ar feadh cúpla nóiméad, ach de ghnáth socraíonn siad síos tar éis croídhín. Tá sé antábhachtach cabhrú le imdhíonacht do linbh a thógáil.

## Fo-iarmhairtí

Beidh fo-iarsmaí ag roinnt leanaí tar éis instealladh. Féadfaidh siad:

- tá deargadh, at nó taobhacht acu nuair a bhí an instealladh acu (imeoidh sé seo go mall leis féin)

- a bheith beagán greannach agus mothaigh go dona
- teocht (fiabhras) a bheith agat

## Fiabhras

Is é fiabhras teocht os cionn 37.5° C.

Tá fiabhras coitianta go leor i leanaí óga, ach de ghnáth bíonn siad éadrom. Má bhraitheann aghaidh do pháiste te chun teagmháil a dhéanamh agus má tá cuma dearg orthu, d'fhéadfadh go mbeadh fiabhras acu.

Ba chóir duit a dteocht a sheiceáil le teirmiméadar.

## Fiabhras a chóireáil agus cosc

Coinnigh do pháiste fionnuar trí:

- ag cinntiú nach bhfuil an iomarca sraitheanna éadaí nó blaincéid orthu
- ag tabhairt neart deochanna fionnuar dóibh.

D'fhéadfadh dáileog de paraicéiteamól leachtach naíonáin cabhrú le fiabhras do linbh a laghdú. Léigh agus lean na treoracha ar an mbuidéal go han-chúramach. B'fhéidir go mbeidh ort dáileog eile a thabhairt 4 go 6 uair an chloig ina dhiaidh sin.

**Cuimhnigh, ná tabhair cógais ina bhfuil aspairín riamh do leanaí faoi bhun 16 bliana d'aois.**

## Coinníollacha agus ailléirgí eile

Níor cheart go gcuirfeadh asma, eachma, fiabhras léana, éadulaingt bia agus ailléirgí cosc ar do leanbh aon vacsaín a bheith agat sa chlár imdhíonaithe óige. Má tá aon cheist agat, labhair le do dhochtúir, altra cleachtais nó le cuairteoir sláinte.

## Cúiseanna nach mbeadh do leanbh in ann a Imdhíonadh

Níl mórán cúiseanna ann nach féidir leanaí a Imdhíonadh. Níor chóir vacsaíní a thabhairt do leanaí a raibh imoibriú anaifíolachtach deimhnithe acu ar dáileog roimhe seo den vacsaín nó ar chomhábhar den vacsaín. Maidir leis an diftéire, teiteanas agus póilió (DTP) ina bhfuil vacsaíní, féadfaidh neomycin, streptomycin nó polymixin B a áireamh leis seo (antaibheathaigh is féidir a chur le vacsaíní i méideanna an-bheaga).



## Leanaí le imdhíon-sochtadh

Go ginearálta, níor chóir do leanaí le 'imdhíon-sochtadh' (a bhfuil córas imdhíonachta lagaithe acu) vacsaíní beo a fháil. Áirítear leis seo leanaí a bhfuil coinníollacha acu a théann i bhfeidhm ar a gcóras imdhíonachta, mar shampla easpa imdhíonachta príomhúil, nó iad siúd atá faoi chóireáil le haghaidh riocht tromchú nó tar éis trasphlandú orgán. Is galair an-annamh iad easpa imdhíonachta a chiallaíonn go bhfuil níos dóichí go bhfaighidh tú ionfhabhtaí. De ghnáth bíonn géine lochtach mar thoradh orthu agus déantar diagnóis orthu go luath tar éis breithe.


Má cheapann tú go mbaineann sé seo le do leanbh, ní mór duit insint lenár ndochtúir, altra cleachtais nó ár gcuariteoir sláinte roimh an imdhíonadh.

Níl aon chúiseanna eile ann nár chóir vacsaíní a thabhairt cinnte.



# Gnáthsceideal vacsáinthe do leanaí

**i** Beidh an sceideal seo beagán difriúil do leanaí a rugadh roimh 31 Nollaig 2024. Scanadh an cód MF nó tabhair cuairt ar [nidirect.gov.uk/childhood-immunisation](http://nidirect.gov.uk/childhood-immunisation) le haghaidh tuilleadh faisnéise.



**i** Má chaill do leambh aon cheann de na vacsáiní seo, labhair le do dhochtúir, le d'altra cleachtas nó le cuairteoir sláinte. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi na vacsáiníthe seo, tabhair cuairt ar [pha.site/vaccinations](http://pha.site/vaccinations)

Cosnaíonn 6-in-1 i gcoinne leicneach diftéire, teiteanas, triuch, póilió, Hib agus heipitíteas B

Cosnaíonn 4-in-1 i gcoinne diftéire, teiteanas, triuch agus póilió

Ná déan dearmad ar do choinne réamhscoile nuair a bhíonn do leanbh 3 bliana 4 mhí.



Más mian leat tuilleadh eolais faoin Imdhíonadh, tabhair cuairt



[pha.site/vaccinations](https://pha.site/vaccinations)

nó



[www.nidirect.gov.uk/childhood-immunisation](https://www.nidirect.gov.uk/childhood-immunisation)



**Public Health Agency**  
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.  
Tel: 0300 555 0114 (local rate).  
[www.publichealth.hscni.net](https://www.publichealth.hscni.net)

Find us on:



Tá an foilseachán seo oiriúnaithe ó fhaisnéis a d'fhorbair an Ghníomhaireacht um Slándála Sláinte na Ríocht Aontaithe (UKHSA) ar dtús agus úsáidtear é faoin gCeadúnas Open Government v 3.0