


Kūdikiams gali pasireikšti tokie pagrindiniai meningito simptomai:


- garsus, aimanuojantis verkimas
- irzlumas paėmus ant rankų;
- mieguistumas, sunku pabudinti
- suglebimas ir vangumas arba sustingimas ir spazminiai judesiai
- blyški, dėmėta arba pamėlusi oda
- karščiavimas, šalti delnai ir pėdos
- raudonos arba violetinės dėmės, kurios paspaudus neišnyksta. (Atlikite toliau aprašytą stiklinės testą.)

i Stipriai prispaudus stiklinę prie septicemijos bėrimo, bėrimas neišnyksta. Bėrimą galima matyti per stiklinę. Tokiu atveju nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Bėrimą gali būti sunkiau pastebėti ant tamsios odos. Apžiūrėkite šviesesnes vietas, pvz., delnus arba pėdas, burnos gomurį, pilvą, akių baltymus ir vokų vidų.



Įprastas vaikų skiepų kalendorius



Jei reikia daugiau informacijos apie skiepus, apsilankykite pha.site/vaccinations arba www.nidirect.gov.uk/childhood-immunisation



Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Tel: 0300 555 0114 (local rate).
www.publichealth.hscni.net

Find us on:

Ši publikacija parengta pagal Jungtinės Karalystės Sveikatos saugos agentūros (UK Health Security Agency) sukurtą informaciją ir naudojama pagal „Open Government Licence“ 3.0 versiją.

Neišnešiotų kūdikių skiepijimas



immunisation
the safest way to protect your child

Nuo 2026 metų

„Didžiausią teigiamą poveikį pasaulio gyventojų sveikatai padarė dvi priemonės: **švarus vanduo ir skiepai.**“

Pasaulio sveikatos organizacija

Kas yra skiepai ir kam jie reikalingi?

Skiepai – tai būdas apsisaugoti nuo sunkių ligų. Kai kurios ligos vaikams gali būti mirtinos arba turėti ilgalaikių pasekmių jų sveikatai. Skiepai paruošia jūsų vaiko imuninę sistemą (natūralią organizmo apsaugos sistemą) kovoti su tomis ligomis, kai vaikas su jomis susiduria.

Kada mano kūdikis turėtų būti paskiepytas?

Svarbu, kad jūsų kūdikis būtų paskiepytas sulaukęs tinkamo amžiaus (žr. paskutinį puslapį). Tai padės sumažinti riziką, kad jūsų kūdikis susirgs sunkia liga. Jei atidėsite skiepimą, gali padidėti šalutinių poveikių rizika.

Mano kūdikis gimė per anksti. Kada pirmą kartą reikėtų paskiepyti neišnešiotus kūdikius?

Neišnešiotiems kūdikiams kyla didesnė infekcijų rizika. Juos reikia skiepyti pagal rekomenduojamą kalendorių praėjus 8 savaitėms po gimimo, nepriklausomai nuo jų išnešiojimo termino. Kūdikis gali būti paskiepytas jam dar esant ligoninėje, todėl šį klausimą reikėtų aptarti su gydytoju.

Kai kuriuos kūdikius, priklausančius didelės rizikos grupei, gali tekti paskiepyti papildomomis vakcinomis iš karto po gimimo. Pavyzdžiui, kai kuriems labai didelės rizikos kūdikiams gali būti skiriama RSV vakcina, kad žiemos mėnesiais juos apsaugotų nuo respiracinio sincitinio viruso. RSV virusas dažnai sukelia kvėpavimo takų infekciją ir gali būti pavojingas. Jei jūsų vaikui reikalinga papildoma apsauga, daugiau informacijos jums suteiks vaiko specialistas, gydytojas arba vozituojuantis sveikatos priežiūros specialistas.

Kas vyksta vizito metu?

Gydytojas arba slaugytojas paaiškins jums skiepavimo procesą ir atsakys į visus jums rūpimus klausimus. Vakcina bus suleista į šlaunies raumenis. Jei jūsų kūdikis gimė labai anksti, jis gali vis dar būti ligoninėje tuo metu, kai ateina laikas pirmajam įprastam skiepui.

Ar yra priešasčių, dėl kurių mano kūdikis neturėtų būti paskiepytas?

Yra labai mažai priešasčių, dėl kurių kūdikių skiepyti negalima. Skiepyti negalima tų kūdikių, kuriems pasireiškė:

- patvirtinta anafilaksinė reakcija (sunki alerginė reakcija) į ankstesnę šios vakcinės dozę, arba
- patvirtinta anafilaksinė reakcija į neomiciną, streptomiciną arba polimiksiną B (vakcinose naudojamus antibiotikus).

Jei jūsų kūdikio imuninė sistema yra susilpnėjusi (pvz., dėl gydymo nuo sunkios ligos - tokios kaip vėžys, arba dėl organų transplantacijos), tuomet kai kurių vakcinų jūsų kūdikiui gali būti negalima skirti. Jūsų gydytojas ar slaugytojas turėtų pasikonsultuoti su specialistu.

Kitų medicininių priešasčių, dėl kurių negalima skiepyti, nėra.

Dažni šalutiniai poveikiai

Injekcijos vieta gali parausti, skaudėti ar būti jautri, o kai kuriems kūdikiams gali pasireikšti lengvas karščiavimas. Pasirūpinkite, kad jūsų vaikas būtų vėsioje aplinkoje:

- duokite jam gerti daug skysčių;
- per šiltai neaprenkite ar neapklorkite;
- duokite skysto vaikiško paracetamolio – dėl dozės pasitarkite su gydytoju.

Temperatūra dažniau pakyla po MenB vakcinės. Norint to išvengti, rekomenduojama po MenB vakcinės 8 ir 12 savaičių amžiaus kūdikiams duoti tris dozes vaikiško paracetamolio. Dėl dozės reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju.

i Jaunesniems nei 16 metų vaikams negalima duoti vaistų, kurių sudėtyje yra aspirino.

Jei nerimaujate dėl savo kūdikio, pasiklaukite savo instinktais ir kreipkitės į savo BP gydytoją.

Daugiau informacijos apie vakcinas, galimus šalutinius poveikius, paracetamolį ir meningitą žr. „*Skiepai vaikams iki vienerių metų*“.



Stebėkite meningito ir septicemijos (kraujo užkrėtimo) požymius

Hib, MenB ir pneumokokinė vakcinės apsaugo nuo pagrindinių bakterijų, sukeliančių meningitą ir septicemiją vaikams ir jaunuoliams. Kadangi šias ligas gali sukelti daugybė kitų bakterijų ir virusų, svarbu žinoti šių ligų požymius ir simptomus.

Pirmieji meningito simptomai yra karščiavimas, dirglumas ir neramumas, vėmimas ir atsisakymas valgyti – šie simptomai taip pat būdingi peršalimui ir gripui. Tačiau meningitu ar septicemija sergančio kūdikio būklė gali labai pablogėti vos per kelias valandas.