

تطعيم الأطفال قبل المدرسة في عمر ثلاث سنوات وأربعة أشهر



immunisation

the safest way to protect your child

من 2026

لقاح الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال (4 في 1)

يقي هذا اللقاح من 4 أمراض مختلفة، وهي الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال.

ينبغي لطفلك تلقي هذه الجرعة في عمر ثلاث سنوات وأربعة أشهر (قبل بدء المدرسة).

سُعطى الطفل جرعة أخرى ضد الدفتريا والتيتانوس وشلل الأطفال بين عمر 14 سنة و18 سنة.

ما السبيل لمعرفة ما إذا كان هذا اللقاح آمنًا وفعالاً؟

يخضع اللقاح لعدة اختبارات للتحقق من أنه آمن وفعال قبل إعطائه لأي شخص. وتستمر هذه الاختبارات حتى بعد تعميم اللقاح. وتُستخدم فقط اللقاحات التي تجتاز جميع اختبارات الأمان. يمكن أن تؤدي جميع الأدوية لأعراض جانبية، غير أن اللقاحات تعتبر الأكثر أمانًا. وقد أظهرت أبحاث من مختلف أنحاء العالم أن التطعيم هو الطريقة الأكثر أمانًا للمحافظة على صحة طفلك. انظر الصفحة 6 لمعرفة المزيد حول الأعراض الجانبية.

مقدمة

تحتوي هذه النشرة على حقائق عن اللقاحات المُعطاة للأطفال قبل عمر الالتحاق بالمدرسة. تشمل هذه اللقاحات لقاح 4 في 1 يهدف الوقاية من الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال.

اعتبارًا من 2026، ينضم لقاح جدري الماء إلى برنامج تطعيم الأطفال كلقاح مُرَكَّب مع لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR). بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، يتوفر اللقاح في عمر 12 و18 شهرًا. فيما يتلقى الأطفال الأكبر سنًا، الذين تلقوا لقاح MMR من قبل، لقاح MMRV خلال موعد تلقي التطعيمات في عمر 3 سنوات و4 أشهر.

إذا وُلد طفلك بين 1 سبتمبر 2022 و31 ديسمبر 2024، فسيتلقى لقاح MMRV خلال موعد تلقي التطعيمات في عمر 3 سنوات و4 أشهر. إذا كنت تود مناقشة هذه المعلومات، فيُرجى الاتصال بطبيبك أو الزائر الصحي أو الممرضة الممارسة.

وقد يكون من المفيد بالنسبة لك أيضًا زيارة الموقع:

[pha.site/vaccinations](https://www.nidirect.gov.uk/childhood-immunisation)
[www.nidirect.gov.uk/
childhood-immunisation](https://www.nidirect.gov.uk/childhood-immunisation)



ما الأمراض التي يقي منها هذا اللقاح؟

الدفتريا

الدفتريا هي مرض خطير سرعان ما يسبب مشكلات في التنفس. وقد يلحق الضرر بالقلب والجهاز العصبي، وربما يؤدي إلى الوفاة في الحالات الشديدة. قبل بدء تعميم لقاح الدفتريا، كانت حالات الإصابة بالدفتريا تصل إلى 1,500 حالة سنويًا في أيرلندا الشمالية.



التيتانوس

التيتانوس هو مرض مؤلم يؤثر على العضلات وقد يسبب مشكلات في التنفس. وهو يؤثر على الجهاز العصبي وقد يؤدي إلى الوفاة. تحدث الإصابة بالتيتانوس عند دخول الجراثيم التي توجد في التربة والروث إلى الجسم عن طريق الجروح أو الحروق. ولا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر غير أنه يوجد عادةً في التربة، وحتى هنا في هذه الدولة.

السعال الديكي (الشاهوق)

السعال الديكي هو مرض قد يسبب نوبات ممتدة من السعال والاختناق ما قد يؤدي إلى صعوبة التنفس. قد يستمر لمدة تصل إلى 10 أسابيع. وقد يكون شديد الخطورة على الأطفال الصغار ويمكن أن يؤدي لوفاة الرضيع دون سن سنة واحدة. ومن الجدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالسعال الديكي في أيرلندا الشمالية قد تجاوز 3,000 حالة في 2024. تبرز هذه الزيادة الأخيرة المفاجئة أهمية التأكد من تلقي طفلك جميع التطعيمات المقررة.

شلل الأطفال

شلل الأطفال هو فيروس يهاجم الجهاز العصبي ويمكن أن يؤدي إلى الشلل الدائم للعضلات. وإذا امتد تأثيره إلى عضلات الصدر أو الدماغ، فقد يسبب الوفاة. قبل البدء في تعميم لقاح شلل الأطفال، كان عدد حالات الإصابة بفيروس شلل الأطفال الذي يسبب الشلل يبلغ 1,500 حالة سنويًا في أيرلندا الشمالية.



الأعراض الجانبية للقاح

لن تظهر أي أعراض جانبية على الأطفال، لكن الأطفال ليسوا جميعًا سواء. فقد يصاب طفلك ببعض الأعراض الجانبية التالية، وتكون عادةً خفيفة:

- سرعة الانفعال لمدة تصل إلى 48 ساعة بعد الحقن؛
- حمى خفيفة (انظر الصفحتين 16-17)؛
- تكوّن كتلة صغيرة في موضع الحقن. وقد تستمر لعدة أسابيع ثم تزول تدريجيًا.

إذا كنت تعتقد أن طفلك مصاب بأي نوع آخر من أنواع الحساسية تجاه لقاح الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال وساورك القلق بشأن ذلك، فناقش طبيبك أو الممرضة الممارسة أو الزائر الصحي في هذا الشأن.

يمكن لأولياء الأمور ومقدمي الرعاية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية المشتبه بها للقاحات والأدوية عن طريق برنامج البطاقة الصفراء Yellow Card Scheme.

يمكن القيام بذلك بزيارة الموقع

mhra.yellowcard.gov.uk أو الاتصال

بالخط الساخن للبطاقة الصفراء Yellow Card

على رقم **0800 731 6789**. تستطيع أيضًا

استخدام رمز QR أو تنزيل تطبيق Yellow Card.



امسح الرمز

في حالات نادرة، قد يسبب اللقاح رد فعل تحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الحكة التي تؤثر على بعض أجزاء الجسم أو كل الجسم. وفي حالات أكثر ندرة، قد يبدي الأطفال رد فعل حاد بعد التطعيم يسبب لهم صعوبة التنفس والانهيار العصبي. ويُعرف هذا بفرط الحساسية.

أظهرت دراسة أُجريت مؤخرًا أن مُعدل الإصابة بفرط الحساسية بعد تلقي التطعيم أقل من حالة واحدة لكل مليون حالة. ربما تكون التفاعلات التحسسية (الحساسية) الشديدة أمرًا مقلقًا، ويتلقى الأشخاص المعينون بإعطاء التطعيمات التدريب على التعامل مع ردود الفعل التحسسية، وتوفير العلاج الذي يؤدي للتعافي السريع والكمال.

في حالات نادرة، قد يصاب الأطفال بنوبة صرع بعد يوم أو يومين من هذا التطعيم. وهذا يرتبط عادةً بالارتفاع الشديد في درجة الحرارة (انظر الصفحة 17). إذا أصيب طفلك بتشنجات، فينبغي لك التماس المشورة الطبية العاجلة. وإذا كانت عيادة الطبيب مغلقة أو لم تتمكن من الاتصال بطبيبك، فتوجه مباشرةً إلى قسم الطوارئ بأقرب مستشفى. عادةً ما يتعافى الأطفال من التشنجات سريعًا وبشكل تام.

قد يصاب الأطفال بالتشنجات في أي وقت، ولذلك قد لا ترتبط إصابتهم بالتشنجات بعد التطعيم بالضرورة بتلقي اللقاح. سيقدر الطبيب ما إذا كان يمكن إعطاء طفلك جرعات أكثر من اللقاح.



يقي لقاح MMRV طفلك من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجذري الماء. بدأ تعميم اللقاحات المحتوية على مكون الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية هنا في 1988. ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد الأطفال الذين يصابون بهذه الأمراض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

لماذا يحتاج طفلي الآن للقاح MMRV الجديد؟

بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، يتوفر اللقاح في عمر 12 و18 شهرًا. فيما يتلقى الأطفال الأكبر سنًا، الذين تلقوا لقاح MMR من قبل، لقاح MMRV خلال موعد تلقي التطعيمات في عمر 3 سنوات و4 أشهر.

إذا كان طفلك مولودًا بين 1 يوليو 2024 و31 ديسمبر 2024، فستتلقى جرعة من لقاح MMR بعد إتمام عامه الأول مباشرة ثم يتلقى جرعة من لقاح MMRV خلال كل من مواعدي تلقي التطعيمات في عمر 18 شهرًا، و3 سنوات و4 أشهر.

وهذا ليحصل على أفضل حماية ضد جذري الماء. تجدر الإشارة إلى أن تلقي 3 لقاحات محتوية على الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لا يثير أي قلق بشأن السلامة.

من المتوقع أنه بإضافة المكون الجديد لجذري الماء ستشهد حالات الإصابة بجذري الماء انخفاضًا شديدًا. يهدف البرنامج لخفض حالات جذري الماء الحادة، والمضاعفات المصاحبة له وحالات دخول المستشفى بسببه.

ما هي الحصبة؟

تحدث الإصابة بالحصبة بسبب فيروس شديد العدوى. جميع من يلتقطون العدوى تقريبًا يصابون بحمى شديدة وطفح جلدي ووعكة صحية بوجه عام. تشمل مضاعفات الحصبة عدوى الصدر ونوبات التشنج (الصرع) والتهاب الدماغ (التهاب وتورم الدماغ)، إلى جانب تلف الدماغ. وقد تؤدي الحصبة إلى الوفاة في بعض الحالات شديدة الخطورة.

ما هو النكاف؟

تحدث الإصابة بالنكاف بسبب فيروس وقد تؤدي إلى الحمى والصداع وألم وتورم الغدد في الوجه والعنق والفك. وقد يسبب الصمم الدائم والتهاب السحايا الفيروسي والتهاب الدماغ (التهاب وتورم الدماغ).

ما هي الحصبة الألمانية؟

الحصبة الألمانية هي مرض يسببه فيروس. تكون الإصابة خفيفة عادةً لدى الأطفال وقد لا تكون ملحوظة. والحصبة الألمانية أثناء الحمل تكون شديدة الخطورة على الأجنة. ويمكن أن تسبب أضرارًا خطيرة للبصر والسمع والقلب والدماغ لديهم. تُعرف هذه الحالة بمتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية (CRS).

ما هو جذري الماء؟

جذري الماء هو مرض شديد العدوى يحدث بسبب فيروس. وهو مرض شائع للغاية ويؤثر على أغلب الأطفال خلال مرحلة الطفولة، على الرغم من إمكانية التقاطه للمرة الأولى في أي عمر. ينتقل المرض من خلال التلامس المباشر بين البشر، أو بشكل غير مباشر من خلال القطرات المنقولة عبر الهواء.

بفضل التطعيم، انخفضت حالات الإصابة بالحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. ومع ذلك لم تختفِ هذه الأمراض كلياً، حيث شهدت السنوات الأخيرة تفشي الحصبة في العالم بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا وأوروبا. يُعطى الأطفال جرعتين من لقاح MMR المركب بشكل دوري في جميع أنحاء أوروبا وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. تجدر الإشارة إلى أن تطعيم طفلك بجرعتين من لقاح MMR المركب يضمن له أفضل حماية.

هل للقاح MMRV أي أعراض جانبية؟

يتضمن لقاح MMRV 4 لقاحات منفصلة في حقنة واحدة. ويظهر مفعول كلٍ من هذه اللقاحات في أوقات مختلفة. بعد التطعيم بحوالي 5 إلى 11 يوماً، يصاب بعض الأطفال بالحمى، ويظهر لديهم طفح جلدي شبيه بالحصبة يزول بعد أن يبدأ مفعول جزء الحصبة في اللقاح.

في حالات نادرة، قد يظهر طفح جلدي على هيئة بقع صغيرة شبيهة بالكدمات خلال 6 أسابيع بعد تلقي اللقاح، ويحدث هذا غالباً بسبب جزء الحصبة أو الحصبة الألمانية. وفي هذه الحالة، يجب اصطحاب الطفل إلى الطبيب.

في حالات نادرة، قد يصاب الطفل بأعراض شبيهة بأعراض النكاف (الحمى والتهاب الغدد) عندما يبدأ مفعول جزء النكاف في لقاح MMRV بعد حوالي 3 أسابيع من الحقن.

ربما يظهر طفح جلدي خفيف شبيه بجدرى الماء بعد التطعيم بالقرب من موضع الحقن، وقد يظهر في موضع آخر. وهو لا يحتاج أي علاج ويتلاشى من تلقاء نفسه.

تعتبر حالات الإصابة بجدرى الماء لدى الأطفال خفيفة نسبياً ويزول المرض دون الحاجة للعلاج على يد طبيب متخصص، غير أن أغلب الأطفال يصابون بوعكة صحية شديدة لعدة أيام تضطرهم للغياب عن المدرسة أو الحضانة خمسة أيام أو أكثر. وربما يتغيب أولياء الأمور عن العمل للاعتناء بهؤلاء الأطفال. يتفاقم المرض لدى بعض الأطفال وتظهر لديهم مضاعفات تشمل العدوى البكتيرية التي تسبب الآفات (البُقَع) الجلدية، وفي حالات نادرة يصابون بالتهاب الدماغ والالتهاب الرئوي فضلاً عن السكتة الدماغية. وقد ينجم عن هذه المضاعفات الإقامة في المستشفى وربما تؤدي في حالات شديدة الندرة للوفاة.

**يمكن أن تكون الإصابة بالحصبة والنكاف والحصبة الألمانية
وجدرى الماء مصحوبة بمضاعفات خطيرة.**

لماذا يحتاج طفلي أكثر من جرعة واحدة من اللقاح الذي يحتوي على مكونات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية؟

لا تعتبر الحصبة والنكاف مرضين شائعين في المملكة المتحدة، ومع هذا لا يزال الأطفال غير المشمولين بالحماية معرضين لخطر التقاط العدوى. تمنح الجرعات الأخرى من اللقاح أفضل مستوى من الحماية لأكثر عدد من الأشخاص.

بعد تلقي الجرعة الأولى، تتراوح نسبة الأطفال غير المشمولين بالحماية من هذه الأمراض بين 5% و 10%. وهذا لأن جهازهم المناعي لا يستجيب للجرعة الأولى. بعد تلقي جرعتين من لقاح MMR، تكون نسبة الأطفال غير المشمولين بالحماية من الحصبة أقل من 1%.

حقائق عن لقاح MMRV

- يقي لقاح MMRV الأطفال من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجذري الماء.
- على مدى أكثر من 40 سنة، أُعطيت أكثر من 500 مليون جرعة من لقاح MMR في حوالي 100 دولة. يتمتع اللقاح بسجل أمان ممتاز.
- لا يوجد دليل على ارتباط لقاح MMR بالتوحد.
- قد يؤدي إعطاء اللقاحات بشكل منفصل لإلحاق الضرر بالطفل. حيث إن ذلك يجعل الطفل معرضًا لخطر التقاط الحصبة أو النكاف أو الحصبة الألمانية أو جذري الماء.
- لا توصي أي دولة بإعطاء جميع اللقاحات بشكل منفصل حيثما تتوافر لقاحات MMRV المركبة.
- يحتوي أحد لقاحات MMRV على جيلاتين الخنزير، ومع ذلك يتوفر بديل له. ناقش طبيبك أو الممرضة أو الزائر الصحي للحصول على المعلومات.
- في العام السابق لتعميم لقاح MMRV في المملكة المتحدة، التقط 86,000 طفل عدوى الحصبة وتوفي 16 طفلًا من جراء الإصابة. نظرًا لانخفاض معدل استهلاك اللقاح، تفشى المرض مؤخرًا في المملكة المتحدة وأيرلندا وأوروبا ولقي بعض الأطفال حتفهم.

إذا أُصيب طفلك بطفح جلدي، يجب اتخاذ إجراء وقائي بتجنب مخالطة الأشخاص الأكثر عرضةً للتقاط عدوى جذري الماء، مثل المصابين بضعف الجهاز المناعي والنساء الحوامل اللاتي لم يلتقطن من قبل عدوى جذري الماء وحديثي الولادة الذين لم تلتقط أمهاتهم عدوى جذري الماء من قبل. ومع ذلك تنخفض احتمالات تمرير عدوى جذري الماء من هذا الطفح الجلدي بعد تلقي لقاح MMRV بدرجةٍ كبيرة.

يصاب حوالي طفل واحد من كل 1000 طفل مصاب بنوبة تشنجات بسبب ارتفاع درجة الحرارة (انظر الصفحة 17 للتعرف على كيفية علاج الحمى). وليس هناك دليل على أن هذه النوبة تسبب مشكلات على المدى البعيد. يعتبر الطفل المصاب بالحصبة أكثر عرضةً خمس مرات للإصابة بنوبة تشنجات نتيجة المرض (5 من كل 1000 حالة).

قد تسبب اللقاحات أيضًا تفاعلات تحسسية. ويحدث ذلك في حالات نادرة للغاية، بمعدل طفل واحدة من كل مليون طفل تلقى التطعيم. ربما تكون التفاعلات التحسسية (الحساسية) الشديدة أمرًا مقلقًا، ويتلقى الأشخاص المعنيون بإعطاء التطعيمات التدريب على التعامل مع ردود الفعل التحسسية، وتوفير العلاج الذي يؤدي للتعافي السريع والكامل.

في حالات نادرة، قد يصاب الأطفال بالتهاب الدماغ بعد تلقي لقاح MMRV. غير أنه إذا التقط طفل لم يتلقَّ التطعيم عدوى الحصبة، ترتفع احتمالات إصابته بالتهاب الدماغ بدرجةٍ كبيرة.

توضح المقارنة بين الأعراض الجانبية للقاح MMRV والأعراض الجانبية للحصبة أو النكاف أو الحصبة الألمانية أو جذري الماء أن اللقاح أكثر أمانًا من الأمراض.

هل خضع الأطفال للمتابعة لمدة كافية بعد تلقي لقاح MMR للتأكد أنه آمن؟

يُعطى لقاح MMR منذ أكثر من 40 سنة وقد استُخدمت أكثر من 500 مليون جرعة منذ ذلك الحين. كما خضع اللقاح للمراقبة الدقيقة في العديد من الدول للتأكد من سلامته وثبت أنه لقاح فعال للغاية ويحظى بسجل أمان متميز.

لقاح MMRV هو الطريقة الأكثر أماناً لحماية طفلك من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجدي الماء.

أليس من الأفضل للأطفال تلقي لقاحات MMRV بشكل منفصل؟

كلا، فإعطاء اللقاحات بشكل منفصل يعني إعطاء الطفل ثماني حقن بدلاً من اثنتين ويجعل الأطفال عرضةً لبعض هذه الأمراض لمدة أطول. وقد تكون هذه الأمراض خطيرة وربما تسبب الوفاة.

أسئلة شائعة

هل تلقي عدة لقاحات مختلفة خلال زيارة واحدة (اللقاح المُركب) أمر آمن؟

نعم، يعتبر تلقي عدة لقاحات مختلفة خلال زيارة واحدة أمراً آمناً. فاللقاحات المُركبة آمنة وفعالة كما الحال مع اللقاحات الفردية. ومن المهم تلقي لقاحات عديدة أو لقاحات مُركبة خلال زيارة واحدة لحماية الطفل من عدة أمراض في أقرب وقت ممكن. كما أن هذا يجعل من السهل استكمال الجرعات الموصى بها في الوقت المحدد.

ولا يعني تلقي جرعات عديدة إرهاق الجهاز المناعي. فمن الناحية النظرية، يستطيع الطفل الاستجابة بشكل فعال لما يقرب من 10,000 لقاح في المرة الواحدة. ولذلك يستطيع الجهاز المناعي البشري بالفعل التعامل مع عدد اللقاحات التي يتلقاها في إطار جدول التحصين الدوري.

هل هناك أسباب تمنع تطعيم طفلي بلقاح الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال (4 في 1) أو لقاح MMRV؟

هناك أسباب قليلة للغاية تمنع تطعيم طفلك. وينبغي لك إعلام طبيبك أو الممرضة الممارسة أو الزائر الصحي إذا كان طفلك:

- مصاباً بارتفاع شديد في درجة الحرارة أو حمى؛
- أُصيب من قبل بتفاعل سيء تجاه أي تطعيم؛
- مصاباً بحساسية شديدة تجاه أي شيء؛
- مصاباً باضطراب النزيف؛
- أُصيب من قبل بتشنجات أو نوبات صرع؛
- تناول أو يتناول حالياً علاجاً للسرطان؛
- مصاباً بأي مرض يؤثر على جهازه المناعي (مثل سرطان الدم أو نقص المناعة البشرية أو الإيدز)؛
- يتناول أي دواء يؤثر على جهازه المناعي (على سبيل المثال، الستيرويدات بجرعات عالية أو العلاجات التي تُعطى بعد زراعة الأعضاء أو لعلاج السرطان)؛
- مصاباً بأي مرض خطير آخر.

كيفية علاج الحمى

1. حافظ على برودة طفلك من خلال التأكد مما يلي:
 - عدم ارتدائه الكثير من الملابس أو تغطيته بعدد كبير من البطاطين؛
 - عدم وجوده في غرفة حارة جدًا (لا ينبغي أن تكون باردة أيضًا، ولكن لطيفة البرودة).
2. إعطائه كمية كبيرة من المشروبات الباردة.
3. إعطائه باراسيتامول سائل (اطلب النوع الخالي من السكر). اقرأ التعليمات المُدوَّنة على زجاجة الدواء بعناية واحرص على إعطاء طفلك الجرعة المناسبة لعمره. قد يلزم الأمر إعطاء الطفل جرعة ثانية بعد أربع إلى ست ساعات.

تذكر أنه لا يجب أبدًا إعطاء الأطفال
دون 16 سنة أدوية محتوية على الأسبرين.

اتصل بالطبيب على الفور إذا تعرض الطفل لما يلي:

- أصيب بدرجة حرارة مرتفعة للغاية (39 درجة مئوية أو أكثر)؛
 - أصيب بتشنجات.
- في هذه الحالة، اجعله يستلقي على جانبه في مكان آمن لأن جسمه قد يرتعش أو يهتز بشدة.

لا يعني هذا دومًا أنه لا يمكن تطعيم طفلك، ولكنه يساعد الطبيب أو الممرضة على اتخاذ قرار بشأن أفضل تطعيمات للطفل وتقديم أي نصائح أخرى. لا يعد التاريخ العائلي للمرض على الإطلاق سببًا يمنع تطعيم الطفل.

ماذا يحدث إذا ارتفعت درجة حرارة طفلي بعد التطعيم؟

الأعراض الجانبية للقاحات التي يتلقاها الأطفال غير شائعة، وتكون عادةً خفيفة وتزول سريعًا. ربما ترتفع درجة حرارة بعض الأطفال أو يصابون بالحمى (أكثر من 37.5 درجة مئوية). إذا كان وجه طفلك ساخنًا عند لمسه وبدا أحمر اللون، فهو على الأرجح مصاب بالحمى. ويمكنك قياس درجة حرارته باستخدام ميزان حرارة.

وإصابة الأطفال الرُّضع و الصغار بالحمى هو أمر شائع إلى حدٍ ما. ويحدث ذلك بسبب العدوى في كثير من الأحيان. أحيانًا يمكن أن تؤدي الحمى لإصابة الطفل بتشنجات. وقد يسبب ذلك أي نوع من أنواع الحمى، سواء كانت ناتجة عن عدوى أو لقاح. ولذا فمن المهم أن تكون على دراية بما يجب فعله لو أُصيب طفلك بحمى. تذكر أن الإصابة بالحمى تحدث بسبب الأمراض أكثر من اللقاحات.



جدول التطعيم الروتيني للأطفال

تطعيم الأطفال الرضع حتى عمر سنة واحدة




8 أسابيع
6 في 1
فيروس الروتا
MenB

تطعيم الأطفال في عمر 18 شهرًا



18 شهرًا
6 في 1
MMRV

تطعيم الأطفال قبل المدرسة في عمر ثلاث سنوات وأربعة أشهر



سنتان وأكثر
لقاح الإنفلونزا للأطفال (سنويًا)



حماية طفلك من الإنفلونزا. تطعيم طفلك الصغير أو في عمر قبل المدرسة

يختلف جدول التطعيمات قليلاً بالنسبة للأطفال المولودين قبل 31 ديسمبر 2024. امسح رمز QR أو تفضل بزيارة الموقع nidirect.gov.uk/childhood-immunisation للتعرف على مزيد من المعلومات.

16 أسبوعًا
6 في 1
عدوى المكورات الرئوية

12 أسبوعًا
6 في 1
فيروس الروتا
MenB

تطعيم الأطفال بعد عامهم الأول مباشرة



سنة واحدة (بعد عامهم الأول مباشرة)
MMRV
MenB
عدوى المكورات الرئوية

3 سنوات و 4 أشهر
4 في 1

4 في 1 يقي من الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال

6 في 1 يقي من الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع b والتهاب الكبد B

إذا فات طفلك تلقي أي من هذه اللقاحات، فاستشر الطبيب أو الممرضة الممارسة أو الزائر الصحي. لمزيد من المعلومات حول هذه التطعيمات، تفضل بزيارة الموقع pha.site/vaccinations



إذا كنت ترغب في معرفة مزيد من المعلومات حول التطعيم، ففضل بزيارة الموقع



[www.nidirect.gov.uk/
childhood-immunisation](http://www.nidirect.gov.uk/childhood-immunisation)

أو



pha.site/vaccinations

هذه النشرة مقتبسة من المعلومات التي طورتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة وتُستخدم بموجب الترخيص الحكومي المفتوح الإصدار 3.0.

HSC Public Health Agency

Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Tel: 0300 555 0114 (local rate).
www.publichealth.hscni.net

Find us on:

