

Imdhíonadh do leanaí réamhscoile

trí bliana agus
ceithre mhí d'aois



Réamhrá

Tá na fíricí sa bhileog seo faoi na vacsaíní a thugtar do leanaí sula dtéann siad ar scoil. Áirítear leis seo vacsaín 4-in-1 chun cosaint a thuilleadh i gcoinne diftéire, teiteanas, triuch agus póilió.

Ó 2026, tá varicella á thabhairt isteach sa chlár vacsaín óige mar vacsaín comhcheangailte le MMR. Do leanaí níos óige, cuirfear ar fáil é ag 12 agus 18 mí d'aois. Tabharfar vacsaín MMRV do leanaí níos sine, a d'fhéadfadh vacsaín MMR a bheith acu roimhe seo, ag a gcoinne 3 bliana 4 mhí.

Má rugadh do leanbh idir 1 Meán Fómhair 2022 agus an 31 Nollaig 2024, tabharfar vacsaín MMRV dóibh ag a gcoinne 3 bliana 4 mhí. Más mian leat labhairt faoin bhfaisnéis seo, déan teagmháil le do dhochtúir, cuairteoir sláinte nó altra cleachtais le do thoil.

B'fhéidir go mbeadh sé cabhrach duit cuairt a thabhairt ar: [pha.site/vaccinations](https://www.pha.gov.uk) nó www.nidirect.gov.uk/childhood-immunisation



An vacsaín diftéire, teiteanas, triuch agus póilió (4-in-1)

Cosnaíonn an vacsaín seo i gcoinne 4 ghalar éagsúla: diftéire, teiteanas, triuch agus póilió.

Ba chóir go mbeadh an dáileog seo ag do leanbh ag trí bliana agus ceithre mhí d'aois (sula dtosaíonn siad ar scoil).

Tabharfar dáileog breise dóibh i gcoinne diftéire, teiteanas agus póilió idir 14 agus 18 mbliana d'aois.

Cén chaoi a bhfuil a fhios againn go bhfuil an vacsaín seo sábháilte agus éi?

Caithfidh vacsaín dul trí go leor tástálacha chun a sheiceáil go bhfuil sé sábháilte agus go n-oibríonn sé sula dtugtar é do dhuine ar bith. Leanann na seiceálacha seo fiú tar éis vacsaín a thabhairt isteach. Ní úsáidtear ach vacsaíní a rith na tástálacha sábháilteachta go léir. Is féidir le gach cógas fo-iarsmaí a bheith ina chúis le gach cógas, ach tá vacsaíní i measc na cinn. Léiríonn taighde ó gach cearn den domhan gurb é an t-Imdhíonadh an bealach is sábháilte chun sláinte do linbh a chosaint. Féach leathanach 6 le haghaidh tuilleadh faoi fho-iarsmaí.

Cad iad na galair a choscafaidh an vacsaín seo?

Diftéire

Is galar tromchúiseach é diftéire a d'fhéadfadh fadhbanna anáilaithe a bheith ina chúis go tapa. Féadann sé damáiste a dhéanamh don chroí agus don néarchóras agus, i gcásanna tromchúiseacha, féadann sé a mharú. Sula dtugadh an vacsaín diftéire isteach, bhí suas le 1,500 cás diftéire in aghaidh na bliana i dTuaisceart Éireann.



Teiteanas

Is galar pianmhar é teiteanas a théann i bhfeidhm ar na matáin agus a d'fhéadfadh fadhbanna anáilaithe a bheith. Bíonn tionchar aige ar an néarchóras agus féadann sé marú. Is cúis le teiteanas nuair a théann frídíní a fhaightear in ithir agus aoileach isteach sa chorp trí ghearrthaí oscailte nó dónna. Ní féidir é a chur ar aghaidh ó dhuine go duine ach bíonn sé i láthair san ithir i gcónaí, fiú sa tír seo.

Triuch

Is galar é triuch a d'fhéadfadh casacht fada casacht agus tachtach a bheith ina chúis le go bhféadfadh sé a bheith deacair anáilú. Is féidir leis maireachtáil ar feadh suas le 10 seachtaine. Is féidir leis a bheith an-tromchúiseach do leanaí óga agus féadann sé fiú leanaí faoi bhliain d'aois a mharú. Tuairiscíodh breis agus 3,000 cásanna triuch

deimhnithe i dTuaisceart Éireann in 2024. Cuireann an borradh seo i gcásanna le déanaí béim ar cé chomh tábhachtach is atá sé a chinntiú go bhfaigheann do leanbh a vacsaíní.

Póilió

Is víreas é póilió a ionsaíonn an néarchóras agus is féidir leis na matáin a cuir pairilis ar go buan. Má théann sé i bhfeidhm ar na matáin cliabhach nó ar an inchinn, is féidir le póilió a mharú. Sula dtugadh an vacsaín póilió isteach, tharla an oiread agus 1,500 cásanna de phóilió ina chúis le pairilis gach bliain i dTuaisceart Éireann.



Fo-iarsmaí an vacsaín

Ní bheidh aon fho-iarsmaí ag mórchuid na bpáistí, ach tá gach páiste difriúil. D'fhéadfadh go bhfaighidh do leanbh cuid de na fo-iarsmaí seo a leanas, atá éadrom de ghnáth:

- greannaitheacht suas le 48 uair an chloig tar éis an instealladh a bheith agat;
- fiabhras éadrom (féach leathanaigh 16-17);
- cnapra beag ag suíomh an insteallta. Féadfaidh sé seo maireamh ar feadh cúpla seachtain agus imeoidh sé go mall.

Má cheapann tú go raibh aon imoibriú eile ag do leanbh ar an vacsaín diftéire, teiteanas, triuch agus póillíó a bhfuil inní ort faoi, labhair le do dhochtúir, le d'altra cleachtais nó le cuairteoir sláinte.

Is féidir le tuismitheoirí agus cúramóirí fo-iarsmaí amhrasta a bhaineann le vacsaíní agus cógais a thuirisciú tríd an Scéim Chárta Buí.



DEÁN
SCANADH

Is féidir é seo a dhéanamh trí chuairt a thabhairt ar **mhra.yellowcard.gov.uk** nó trí ghlaoch ar líne an Chárta Buí ar **0800 731 6789**. Is féidir leat an cód MF a úsáid freisin nó tríd an aip Cárta Buí a íoslódáil.

Go hannamh, d'fhéadfadh frithghníomhú ailléirgeach a bheith ina chúis le vacsaín, mar shampla gríos nó tochas a théann i bhfeidhm ar chuid den chorp. Níos annamh fós, d'fhéadfadh go mbeadh imoibriú tromchúiseach ag leanaí ar an Imdhíonadh, rud a chruthaíonn sé deacracht. Tugtar anaifiolacsas air seo.

Léirigh staidéar le déanaí go dtuairiscítear níos lú ná 1 chás anaifiolacsas i ngach milliún Imdhíonadh a thugtar. Cé go bhfuil inní ar tromchúiseacha frithghníomhuithe ailléirgeacha (anaifiolachtacha) nuair a tharlaíonn siad, déantar oiliúint ar na daoine a thugann imdhíonadh chun déileáil le frithghníomhartha anaifilachtacha, agus beidh téarnamh tapa agus iomlán mar thor.

Go hannamh, d'fhéadfadh go mbeadh taom ag leanaí lá nó dhó tar éis an vacsaínithe seo. De ghnáth baineann sé seo le teocht an-ard (féach leathanach 17). Má tá taom ag do leanbh, ba chóir duit comhairle leighis práinneach a lorg. Má tá do mháinliacht dúnta nó mura féidir leat teagmháil a dhéanamh le do dhochtúir, téigh díreach chuig an roinn éigeandála ospidéil is gaire. De ghnáth téarnaíonn leanaí ó taomanna go tapa agus go hiomlán.

Is féidir le leanaí óga a bheith taom ag am ar bith, mar sin b'fhéidir nach gá go mbeadh taom acu tar éis a gcuid vacsaínithe nasctha leis an. Cinneoidh do dhochtúir an féidir le do leanbh níos mó dáileoga den vacsaín a bheith agat.



An vacsaín MMRV

Cosnaíonn vacsaín MMRV do leanbh i gcoinne bruitíneach (M), leicneach (M), rubella (R; bruitíneach dhearg) agus Varicella (V; deilgneach).

Tugadh vacsaíní ina raibh MMR isteach anseo i 1988. Ó shin i leith, tá líon na leanaí a ghabhann na ngalair seo tar éis titim go dtí an méid íseal riamh.

Cén fáth a bhfuil an vacsaín nua MMRV ag teastáil ó mo leanbh anois?

Do leanaí níos óige, cuirfear ar fáil é ag 12 agus 18 mí d'aois. Tabharfar vacsaín MMRV do leanaí níos sine, a d'fhéadfadh vacsaín MMR a bheith acu roimhe seo, ag a gcoinne 3 bliana 4 mhí.

Má rugadh do leanbh **idir 1 Iúil 2024 agus an 31 Nollaig 2024**, agus má fuair siad dáileog de vacsaín MMR díreach tar éis a gcéad lá breithe, tabharfar dáileog vacsaín MMRV dóibh ag gach ceann dá gcoinní 18 mhí agus 3 bliana 4 mhí.

Tá sé seo chun cosaint níos fearr a sholáthar i gcoinne varicella (deilgneach). Ní chuireann aon imní sábháilteachta ar 3 vacsaíní ina bhfuil MMR a fháil.

Táthar ag súil go laghdóidh cásanna sicín a fheictear san óige go suntasach le comhpháirt deilgneach leis an gcomhpháirt varicella a chur leis. Laghdóidh an clár cásanna tromchúiseacha deilgneach, deacrachtaí gaolmhara agus ospidéal.

Cad is bruitíneach ann?

Is é víreas an-thógálach is cúis le bruitíneach. Beidh fiabhras ard, gríos ag beagnach gach duine a ghlacann é agus go ginearálta beidh siad tinn. I measc na deacrachtaí a bhaineann le bruitíneach tá ionfhabhtuithe cliabhach, taomanna, einceifealaíteas (athlasadh agus at na hinchinne) agus damá. I gcásanna an-tromchúiseacha, is féidir le bruitíneach marú.

Cad is leicneach ann?

Is é víreas is cúis le leicneach agus d'fhéadfadh fiabhras, tinneas cinn agus borrfhaireoga pianmhara, ata san aghaidh, sa mhúineál agus an fhód a bheith mar thoradh air. D'fhéadfadh bodhaire buan, meiningíteas víreasach agus einceifealaíteas (athlasadh agus at na hinchinne) a bheith mar thoradh air.

Cad é rubella?

Is galar é Rubella (bruitíneach dhearg) de bharr víreas. I leanaí bíonn sé éadrom de ghnáth agus féadfaidh sé a bheith faoi deara. Tá rubella le linn toirchis, áfach, an-tromchúiseach do leanaí gan breith. Féadann sé dochar mór a dhéanamh dá radhairc, éisteacht, croí agus inchinn. Tugtar siondróm rubella ó bhroinn (CRS) ar an riocht seo.

Cad é varicella (deilgneach)?

Is galar an-tógálach é deilgneach (varicella) de bharr víreas. Tá varicella an-choitianta agus bíonn tionchar ag formhór na leanaí le linn óige, cé gur féidir é a ghabháil den chéad uair ag aois ar bith. Tarchuirtear é trí theagmháil dhíreach idir daoine, nó go hindíreach trí

braoiníní aer-iompair. Tá an chuid is mó de na cásanna varicella i leanaí réasúnta éadrom agus réiteann an tinneas gan aon ghá le cóireáil ó ghairmí leighis, cé go bhfuil an chuid is mó de na leanaí tinn ar feadh roinnt laethanta agus caillfidh siad cúig lá nó níos mó ón scoil nó ón naíolann. B'fhéidir go mbeidh ar thuismitheoirí am saor in obair a thógáil chun aire a thabhairt dó. Mar sin féin, rachaidh roinnt leanaí ar aghaidh ag forbairt deacrachtaí ó varicella lena n-áirítear ionfhabhtú baictéarach ar loit craicinn (spotaí) agus, i gcásanna neamhchoitianta, einceifealaíteas (at na hinchinne), niúmóiníteas (ionfhabhtú scamhóg) agus stróc. Is féidir leis na deacrachtaí seo a bheith mar thoradh ar an ospidéal agus is annamh a bhféadfadh bás a bheith.

Is féidir le deacrachtaí tromchúiseacha a bheith ag brúiteach, leicneach, rubella agus varicella.

Cén fáth a bhfuil níos mó ná dáileog amháin de vacsaín ina bhfuil MMR de dhíth ar mo pháiste?

Cé go bhfuil brúiteach agus leicneach neamhchoitianta sa RA, tá leanaí nach bhfuil cosanta fós i mbaol na hionfhabhtuithe a ghabháil. Tabharfaidh tuilleadh dáileoga den vacsaín an leibhéal cosanta is fearr don líon is mó daoine.

Tar éis an chéad dáileog, níl idir 5% agus 10% de na leanaí gan chosaint i gcoinne gach ceann de na galair. Tá sé seo toisc nár fhreagair a gcóras imdhíonachta don chéad dáileog. Tar éis dhá dáileog de MMR, fágtar níos lú ná

1% de na leanaí gan chosaint i gcoinne brúiteach.

A bhuíochas le himdhíonadh, laghdaíodh líon na gcásanna de bhruithíneach, leicneach agus rubella. Mar sin féin, níor imigh na galair seo agus tá ráigeanna brúiteach ann le blianta beaga anuas ar fud an domhain, san Ríocht Aontaithe, in Éirinn agus san Eoraip lena n-áirítear. Tugtar dhá dháileog den vacsaín comhcheangailte MMR go rialta ar fud na hEorpa chomh maith le SA, Ceanada, san Astráil agus sa Nua-Shéalainn. Tabharfar an chosaint is fearr dóibh a Imdhíonadh do leanbh le dhá dáileog den vacsaín comhcheangailte MMR.

An bhfuil aon fho-iarsmaí ag MMRV?

Tá 4 vacsaín ar leithligh ag MMRV in instealladh amháin. Oibríonn na vacsaíní ag amanna éagsúla. Timpeall 5 go 11 lá tar éis an imdhíonadh, éiríonn roinnt leanaí fiabhras, forbraíonn siad gríos cosúil le miasail agus téann siad as a gcuid bia de réir mar a thosaíonn an chuid brúiteach den vacsaín ag obair.

Is annamh, d'fhéadfadh gríos de spotaí beaga cosúil le ballbhrú a bheith le feiceáil laistigh de 6 seachtaine ón vacsaín, de ghnáth is cúis leis an gcuid brúiteach nó rubella. Má tá sé seo le feiceáil, tabhair do leanbh chuig an dochtúir.

Is annamh, thart ar 3 seachtaine tar éis an instealladh, d'fhéadfadh comharthaí cosúil le leicneach a fháil ar leanbh (fiabhras agus borrfhaireoga) de réir mar a thosaíonn cuid na leicneach de MMRV ag obair.

D'fhéadfadh gríos éadrom cosúil le deilgneach a bheith le feiceáil tar éis vacsaínithe in aice leis an suíomh insteallta

ach is féidir léiriú in áiteanna eile. Níl cóireáil de dhíth ar an ngríos seo agus glanann sé suas leis féin.

Má fhaigheann do leanbh gríos, mar réamhchúram seachain dlúth-theagmháil le daoine atá níos leochaillí ó ionfhabhtú deilgneach, mar shampla iad siúd a bhfuil córais imdhíonachta lagaithe acu, mná torracha nach raibh deilgneach orthu riamh agus nuabheirthe nach raibh deilgneach ag a máithreacha. Mar sin féin, tá an seans go rachaidh deilgneach ón ngríos seo tar éis an vacsaín MMRV a fháil thar a bheith íseal.

Beidh taom ag thart ar 1 as 1,000 de bharr teocht ard (féach leathanach 17 maidir le conas fiabhras a chóireáil). Níl aon fhianaise ann go gcuireann sé seo fadhbanna fadtéarmacha. Tá cúig huaire níos dóichí go mbeidh taom ag leanbh a bhfuil bruitíneach aige mar thoradh ar an tinneas (5 in 1,000).

Is féidir le vacsaíní frithghníomhuithe ailléirgeacha. Tá siad seo an-annamh, níos lú ná 1 i gceann milliún Imdhíonadh. Cé go bhfuil imní ar tromchúiseacha frithghníomhuithe ailléirgeacha (anafiolachtacha) nuair a tharlaíonn siad, déantar oiliúint ar na daoine a thugann imdhíonadh chun déileáil le frithghníomhartha anaifilachtacha, agus beidh téarnamh tapa agus iomlán mar thor.

Is annamh, féadfaidh leanaí einceifealaíteas (at na hinchinne) a fhorbairt tar éis an vacsaín MMRV. Mar sin féin, má ghlacann leanbh neamhvacsáinthe an bruitíneach, tá an seans go bhforbróidh einceifealaíteas i bhfad níos airde.

Taispeánann comparáidí idir fo-iarsmaí MMRV agus fo-iarsmaí bruitíneach, leicneach, rubella nó varicella go

bhfuil an vacsaín i bhfad níos sábháilte ná na galair.

Fíricí faoin vacsaín MMRV

- Cosnaíonn MMRV leanaí i gcoinne bruitíneach, leicneach, rubella agus varicella.
- Le breis agus 40 bliain, tugadh níos mó ná 500 milliún dáileog de MMR i dtimpeall 100 tír. Tá taifead sábháilteachta den scoth aige.
- Níl aon fhianaise ann faoi aon nasc idir MMR agus uathachas.
- D'fhéadfadh sé go mbeadh díobhálach do na vacsaíní a thabhairt. Fágann sé leanaí oscailte don mbaol go bhfaighidh sé bruitíneach, leicneach, rubella nó varicella.
- Nuair a bhíonn vacsaíní comhcheangailte MMRV ar fáil, ní mholann aon tír na vacsaíní go léir a thabhairt ar leithligh.
- Cé go bhfuil geilitín muc i vacsaín MMRV amháin, tá rogha eile ar fáil. Labhair le do dhochtúir, altra nó cuairteoir sláinte le haghaidh faisnéise.
- Sa bhliain sular tugadh MMR isteach sa RA, ghabh 86,000 leanbh an bruitíneach agus fuair 16 bás. Mar gheall ar iontógáil íseal vacsaín, bhí ráigeanna le déanaí sa RA, in Éirinn agus san Eoraip agus tá roinnt leanaí bás.

Ar leanadh leanaí fada go leor tar éis MMR chun a fháil amach go bhfuil sé sábháilte?

Tugadh MMR le breis agus 40 bliain agus úsáideadh os cionn 500 milliún dáileog. Rinneadh monatóireacht chúramach ar a shábháilteacht i go leor tíortha

agus léiríodh gur vacsaín an-éifeachtach é le taifead sábháilteachta den scoth.

Is é MMRV an bealach is sábháilte chun do leanbh a chosaint ar bhruithíneach, leicneach, rubella agus varicella.

Nach mbeadh sé níos fearr do leanaí na vacsaíní MMRV a bheith acu ar leithligh?

Níl, chiallódh na vacsaíní a thabhairt ar leithligh ocht instealladh in ionad dhá cheann agus d'fhágfadh leanaí nochta do chuid de na galair ar feadh níos faide. Is féidir leis na galair seo a bheith tromchúiseach agus fiú marfach.

Ceisteanna coitianta

An bhfuil sé sábháilte roinnt vacsaíní éagsúla a fháil le linn cuairt amháin (vacsaín comhcheangailte)?

Sea, tá sé sábháilte roinnt vacsaíní éagsúla a fháil le linn cuairte amháin. Tá vacsaíní comhcheangailte chomh sábháilte agus chomh héifeachtach le. Tá sé tábhachtach roinnt vacsaíní nó vacsaíní comhcheangailte a fháil in aon chuairt amháin chun leanaí a chosaint ar ghalair éagsúla chomh luath. Fágann sé seo go bhfuil sé níos éasca freisin na dáileoga a mholtar a chur i gcrích in am.

Ní chuireann dáileoga iolracha a fháil sáraíonn an córas imdhíonachta. Go teoiriciúil, d'fhéadfadh leanbh freagairt go héifeachtach do thart ar 10,000 vacsaín ag aon am amháin. Is féidir lenár gcórais imdhíonachta déileáil go héasca le líon na vacsaíní a thugtar sa ghnáthsceideal imdhíonaithe.

An bhfuil aon chúiseanna ann nár chóir mo pháiste a lmdhíonadh leis an vacsaín diféire, teiteanas, triuch agus póilió (4-in-1) nó MMRV?

Níl mórán cúiseanna ann nár chóir do leanbh a lmdhíonadh. Ba chóir duit a chur in iúl do dhochtúir, d'altra cleachtais nó do chuariteoir sláinte an bhfuil do leanbh:

- tá teocht nó fiabhras an-ard aige;
- bhí droch-imoibriú aige ar aon lmdhíonadh;
- tá ailléirge tromchúiseach aige le haon rud;
- tá neamhord fullithe aige;
- bhí tar trithí nó taomanna aige;
- bhí cóireáil ar ailse aige nó a bhfuil cóireáil air faoi láthair;
- aon bhreiteacht aige a théann i bhfeidhm ar an gcóras imdhíonachta (cosúil le leicéime, VEID nó SEIF);
- ag glacadh aon leigheas a théann i bhfeidhm ar an gcóras imdhíonachta (mar shampla stéaróidigh arddáileog nó cóireálacha a thugtar tar éis trasphlandú orgán);
- tá aon tinneas tromchúiseach eile aige.

Ní chiallaíonn siad seo i gcónaí nach féidir do leanbh a Imdhíonadh, ach cabhraíonn sé leis an dochtúir nó an altra cinneadh a dhéanamh cé na himdhíonachtaí is fearr do do leanbh agus an gcaithfidh siad aon chomhairle eile a thabhairt duit. Níl stair teaghlaigh breoiteachta ina chúis riamh nach ndéanfar leanbh a Imdhíonadh.

Cad a tharlaíonn má fhaigheann mo leanbh teocht ard tar éis an imdhíonaithe?

Tá fo-iarsmaí ó vacsaíní neamhchoitianta, de ghnáth éadrom agus imíonn siad go tapa. D'fhéadfadh go bhfaighidh roinnt leanaí teocht nó fiabhras ardaithe (os cionn 37.5° C). Má bhraitheann aghaidh do pháiste te chun teagmháil a dhéanamh agus má tá cuma dearg orthu, is dócha go bhfuil fiabhras acu. D'fhéadfá a dteocht a sheiceáil le teirmiméadar.

Tá fiabhras coitianta go leor i leanaí agus i páistí. Is minic a fhaigheann siad seo le hionfhabhtui. Uaireanta, is féidir le fiabhras a bheith ina chúis le leanbh taom. Is féidir le haon fiabhras a bheith ina chúis leis seo, cibé an bhfuil an fiabhras mar gheall ar ionfhabhtú nó vacsaín. Mar sin tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat cad atá le déanamh má tá fiabhras ag do leanbh. Cuimhnigh, is dóichí go mbeidh fiabhras mar thoradh ar na galair ná mar gheall ar na vacsaíní.



Conas fiabhras a chóireáil

1. Coinnigh do leanbh fionnuar trí chinntiú:
 - ní l an iomarca sraitheanna éadaí nó blaincéid acu;
 - ní l an seomra ina bhfuil siad ró-te (níor chóir go mbeadh sé fuar ach an oiread, díreach fionnuar taitneamhach).
2. Tabhair neart deochanna fionnuar dóibh.
3. Tabhair paraicéiteamól leachtach dóibh (iarr saor ó siúcra). Léigh na treoracha ar an mbuidéal go cúramach agus tabhair an dáileog cheart do do leanbh dá aois. B'fhéidir go mbeidh ort an dara dáileog a thabhairt ceithre go sé uair an chloig ina dhiaidh sin.

Cuimhnigh, ná tabhair cógais riamh ina bhfuil aspairín do leanaí faoi bhun 16 bliana d'aois.


Glaigh ar an dochtúir láithreach má tá do leanbh:

- tá teocht an-ard aige (39° C nó os a chionn);
- tá taom aige.

Má tá taom ag do leanbh, leagan iad ar a taobh in áit shábháilte toisc go bhféadfadh a gcorp tarraingt nó bualadh.

Gnáthsceideal vacsáinthe do leanaí

i Beidh an sceideal seo beagán difriúil do leanaí a rugadh roimh 31 Nollaig 2024. Scanadh an cód MF nó tabhair cuairt ar nidirect.gov.uk/childhood-immunisation le haghaidh tuilleadh faisnéise.



i Má chail do leanbh aon cheann de na vacsáin seo, labhair le do dhochtúir, le d'altra cleachtas nó le cuairteoir sláinte. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi na vacsáinthe seo, tabhair cuairt ar pha.site/vaccinations



Más mian leat tuilleadh eolais faoin Imdhíonadh, tabhair cuairt



pha.site/vaccinations

nó



www.nidirect.gov.uk/childhood-immunisation



Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Tel: 0300 555 0114 (local rate).
www.publichealth.hscni.net

Find us on:



Tá an foilseachán seo oiriúnaithe ó fhaisnéis a d'fhorbair an Ghníomhaireacht um Slándála Sláinte na Ríocht Aontaithe (UKHSA) ar dtús agus úsáidtear é faoin gCeadúnas Open Government v 3.0