

TESTAREA AUZULUI BEBELUȘULUI DUMNEAVOASTRĂ

Testarea nou-născuților care se află ori s-au aflat în secția de terapie intensivă neonatală sau în unități pediatrice speciale.

Bebelușului dumneavoastră i se vor efectua o serie de examinări de rutină ale stării de sănătate în primele câteva săptămâni de viață. Acestea vor include și o testare a auzului.

Testarea auzului utilizează două teste simple pentru verificarea auzului.

De ce se testează auzul bebelușului meu?

Un mic număr de copii se nasc cu deficiențe de auz. Testarea permite să fie identificați de timpuriu aproape toți acești copii. Identificarea timpurie este importantă pentru dezvoltarea copilului. De asemenea, înseamnă că părinții pot beneficia de suport și informații într-un stadiu timpuriu.

Există riscul ca bebelușul meu să sufere de o deficiență de auz?

Există mai mulți factori cunoscuți care ar putea face ca bebelușul dumneavoastră să prezinte riscul unei deficiențe de auz. Printre aceștia se numără:

- bebelușul a avut nevoie de terapie intensivă în primele zile de viață;
- unele afecțiuni medicale;
- alți membri ai familiei restrânse a bebelușului care suferă de o deficiență de auz de la naștere sau din primii ani ai copilăriei.

Când și unde se va efectua testarea?

Testarea se efectuează de regulă înainte ca bebelușul dumneavoastră să iasă din spital. Dacă nu se întâmplă acest lucru, vi se va stabili o programare.

Testarea este dureroasă pentru bebelușul meu?

Nu. Nu este dureroasă. De regulă, se efectuează când bebelușul doarme. Nu se utilizează anestezice sau sedative.

Ce presupune testarea?

Testele sunt efectuate de o persoană instruită în testarea auzului. Testarea implică două părți.

1. Test de emisie otoacustică (OAE)

Examinatorul amplasează o mică piesă auriculară cu capăt moale în partea externă a urechii bebelușului dumneavoastră, iar această piesă transmite în ureche sunete de tip clic. În momentul în care partea internă a urechii recepționează un sunet, de regulă se produce un ecou. Cu ajutorul unui computer, examinatorul poate vedea cum răspunde urechea bebelușului dumneavoastră la sunet.

2. Test de răspuns auditiv automat al trunchiului cerebral (AABR)

Se amplasează mici senzori pe capul bebelușului, pe umeri și pe ceafă. Pe urechile bebelușului se așează un set de căști supraauriculare moi și se pornește o serie de sunete de tip clic. Un computer măsoară modul în care urechile bebelușului răspund la sunet.

Ambele teste sunt simple, absolut sigure și nu sunt dureroase. Puteți sta cu bebelușul dumneavoastră pe parcursul testelor. Dacă bebelușul dumneavoastră se află într-o secție de pediatrie și nu îl puteți vizita oricând în timpul zilei, testarea se poate efectua în absența dumneavoastră.

Cum se interpretează rezultatele?

- **Dacă testele arată un răspuns puternic la ambele urechi ale bebelușului dumneavoastră:** aceasta înseamnă că este puțin probabil ca bebelușul dumneavoastră să aibă o deficiență de auz. Cu toate acestea, este important să verificați auzul bebelușului dumneavoastră pe măsură ce crește. În unele cazuri, pentru bebelușul dumneavoastră se pot programa testări ulterioare, chiar dacă pe ecran apar răspunsuri clare.

În fișa medicală pediatrică a bebelușului dumneavoastră (PCHR) - cartea roșie, există o secțiune care vă oferă recomandări cu privire la sunetele la care bebelușul ar trebui să reacționeze și tipurile de sunete pe care ar trebui să le scoată pe măsură ce crește. Dacă vreodată aveți orice îngrijorări în legătură cu auzul bebelușului dumneavoastră, trebuie să discutați despre acestea cu asistentul medical comunitar sau cu medicul de familie.

- **Dacă testarea nu arată un răspuns puternic de la una sau ambele urechi:**

acest lucru se întâmplă adesea și nu înseamnă neapărat că bebelușul dumneavoastră are o deficiență de auz. Printre motivele frecvente de lipsă a unui răspuns puternic se numără:

- bebelușul nu a stat liniștit în momentul efectuării testului;
- a existat un zgomot de fond în momentul efectuării testului;
- în ureche exista lichid sau un blocaj temporar.

Dacă examinatorul nu obține un răspuns clar la ambele urechi, vi se va efectua o programare pentru a-l duce pe bebelușul dumneavoastră la o clinică de audiologie unde i se vor efectua și alte teste pentru măsurarea auzului. Veți primi o broșură în care vi se va explica ce înseamnă acest lucru.

Care este probabilitatea ca bebelușul meu să aibă o deficiență de auz?

La majoritatea bebelușilor se vor înregistra răspunsuri clare la testul de screening și la orice teste ulterioare efectuate de audiolog. Aprox. 3 din fiecare 1.000 bebeluși care au petrecut cel puțin 2 zile întregi în secția de terapie intensivă prezintă o deficiență de auz. Depistarea timpurie a unei deficiențe de auz la un bebeluș înseamnă că părintele și copilul primesc recomandări și suport adecvate încă de la început.

Ce facem cu informațiile provenite din testele efectuate bebelușului dumneavoastră

Informațiile provenite din rezultatele testelor de auz efectuate nou-născutului dumneavoastră se înregistrează în fișa medicală personală a acestuia (PCHR) - cartea roșie și în sistemul de sănătate a copiilor (computerizat) (CHS). Dezvăluim aceste rezultate ale testelor de auz asistentului dumneavoastră medical comunitar, medicului dumneavoastră de familie și personalului care efectuează teste de auz la nou-născuți și furnizează servicii de audiologie în zona în care locuiți.

Vă rugăm să consultați paginile i și ii din PCHR dacă doriți să aflați mai multe despre ce informații se colectează, cum se păstrează și se utilizează acestea și cui sunt dezvăluite.

Date de contact telefonic ale cabinetului dumneavoastră local de testare a nou-născuților:

Belfast HSC Trust: 028 9063 3558

Northern HSC Trust: 028 2563 5674

South Eastern HSC Trust: 028 9056 4748

Southern HSC Trust: 028 3861 3834

Western HSC Trust: 028 7134 5171 int. 216115

Pentru mai multe informații privind programul de testare a auzului la nou-născuți, contactați:
The National Deaf Children's Society (NDCS)

Linia telefonică gratuită pentru informații NDCS: 0800 800 8880 (voce și SMS)

Fax: 020 7251 502

E-mail: helpline@ndcs.org.uk

Web: www.ndcs.org.uk

Alte traduceri ale acestei broșuri sunt disponibile pentru vizualizare/descărcare la adresa:

<http://www.publichealth.hscni.net/publications/newborn-hearing-screening>

Această broșură se bazează pe broșura cu informații pentru pacient publicată anterior de NDCS.

January 2015